

15g

**MEDISUN**

THUỐC DÙNG NGOÀI DA

**Thành phần:** Mỗi tuýp 15g gel chứa Benzoyl peroxid.....0,75g ( dưới dạng Hydrous benzoyl peroxid)  
Tã được vừa đủ

**Bảo quản:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

**VINOYL - 5**  
Benzoyl Peroxid 5%  
( Dưới dạng Hydrous Benzoyl Peroxid )

**MEDISUN**

Hộp 1 tuýp 15g

Số lô SX:  
HD:

Khối lượng tịnh : 15g

**VINOYL - 5**  
Benzoyl Peroxid 5%  
( As Hydrous Benzoyl Peroxid )

**FOR TOPICAL USE ONLY**

**COMPOSITION**  
Each tube ( 15g) contains:  
Benzoyl peroxid.....0,75g  
(as hydrous benzoyl peroxid)  
Excipients.....q.s

**Indication, Dosage and Administration, Contraindication and Other Information:**  
Please see the package insert inside  
**Storage:** In a tight container, protect from moisture and light, at below 30°C  
**Carefully read the leaflet inside before using**  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**VINOYL - 5**  
Benzoyl Peroxid 5%  
( Dưới dạng Hydrous Benzoyl Peroxid )

**THUỐC DÙNG NGOÀI DA**

Hộp 1 tuýp 15g

**MEDISUN**

Box of 15g tube

**MEDISUN**

Sản xuất bởi:  
Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun  
Số 521, Khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi,  
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quy cách: Hộp 1 tuýp 15g gel

**Thành phần:** Mỗi tuýp (15g) gel chứa Benzoyl peroxid.....0,75g ( dưới dạng Hydrous benzoyl peroxid)  
Tã được vừa đủ

**Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

**Bảo quản:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.**

SBK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
Lần đầu: 08/10/18018

**M.S.D.N.0309588210-C.T.C.P.C.H**  
**CÔNG TY**  
**CƠ PHÂN**  
**PHÚC LONG**  
QUẬN 3-TP.HỒ CHÍ MINH

M-34732  
140/4163  
OK

**MEDISUN**

THUỐC DÙNG NGOÀI DA

**Thành phần:** Mỗi tuýp 30g gel chứa Benzoyl peroxid.....1,5g ( dưới dạng Hydrous benzoyl peroxid)  
Tã được vừa đủ  
**Bảo quản:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

**VINOYL - 5**  
Benzoyl Peroxid 5%  
( Dưới dạng Hydrous Benzoyl Peroxid )

**MEDISUN**

Hộp 1 tuýp 30g

Số lô SX:  
HD:

Khối lượng tịnh : 30g

**VINOYL - 5**  
Benzoyl Peroxid 5%  
( As Hydrous Benzoyl Peroxid )

**FOR TOPICAL USE ONLY**

**MEDISUN**

Box of 30g tube

**Thành phần:** Mỗi tuýp (30g) gel chứa Benzoyl peroxid.....1,5g ( dưới dạng Hydrous benzoyl peroxid)  
Tã được vừa đủ  
**Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.  
**Bảo quản:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.**

**Sản xuất bởi:**  
Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun  
Số 521, Khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi,  
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

**Quy cách:** Hộp 1 tuýp 30g gel

SPK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

**COMPOSITION**  
Each tube ( 30g) contains:  
Benzoyl peroxid.....1,5g  
(as hydrous benzoyl peroxid)  
Excipients:.....q.s

**Indication, Dosage and Administration, Contraindication and Other Information:**  
Please see the package insert inside  
**Storage:** In a tight container, protect from moisture and light, at below 30°C  
**Carefully read the leaflet inside before using**  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**VINOYL - 5**  
Benzoyl Peroxid 5%  
( Dưới dạng Hydrous Benzoyl Peroxid )

**MEDISUN**

Hộp 1 tuýp 30g

**VINOYL - 5**  
Benzoyl Peroxid 5%  
( Dưới dạng Hydrous Benzoyl Peroxid )

**MEDISUN**

THUỐC DÙNG NGOÀI DA



“Độc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng”  
 “Đề xa tâm tay trẻ em”  
 “Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được si những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

**VINOYL-5**



**PHẦN THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH**

**Thành phần, hàm lượng của thuốc:**

Hoạt chất:

Anhydrous benzoyl peroxid.....5% (dưới dạng hydrous benzoyl peroxid)

Tá dược: Carbomer 940, edetic acid, polyoxyethylen lauryl ether, natri hydroxid, nước tinh

khiet

Mô tả sản phẩm: Gel bôi ngoài da

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuyp 15 g, hộp 1 tuyp 30 g.

**Thuốc dùng cho bệnh gì?**

Benzoyl peroxid được dùng tại chỗ để điều trị mụn trứng cá.

**Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?**

Trước khi dùng thuốc, phải rửa sạch và làm khô các vùng có mụn trứng cá hoặc mụn mủ ở

mặt, cổ hoặc bất cứ nơi nào khác trên cơ thể.

Bôi một lớp rất mỏng, ngày 1-2 lần. Tốt nhất là nên dùng thuốc vào lúc đi ngủ để thuốc tác

dụng qua đêm.

**Khi nào không nên dùng thuốc này?**

Bệnh nhân qua mẫn cảm với benzoyl peroxid hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

**Tác dụng không mong muốn (nếu có):**

Trên da và các rối loạn ở các mô dưới da:

Rất thông gặp, 1/100 ≤ ADR < 1/10: khô da, ban đỏ, bong tróc da, da kích ứng nông độ.

Thông gặp, 1/100 ≤ ADR < 1/10: ngứa da, cảm giác da đau râm ran, kích ứng (các triệu

chứng có liên quan tới viêm da).

Ít gặp, 1/1000 ≤ ADR < 1/100: dị ứng da.

Một số tác dụng không mong muốn chưa rõ tần suất gặp: sung mắt.

**Hướng dẫn cách sử dụng:**

Thuốc chỉ được dùng ngoài. Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt, niêm mạc, môi và miệng. Nếu

không may tiếp xúc xảy ra, phải rửa kỹ với nước.

Cần xác định xem người bệnh có mẫn cảm với benzoyl peroxid hay không, bằng cách trước

hết bôi thử trên một vùng nhỏ. Nếu có kích ứng hoặc khô da thì nên giảm số lần dùng. Nếu bị

ngứa nhiều, đỏ, nóng bỏng, sưng phồng hoặc kích ứng, thì ngưng thuốc và hỏi ý kiến thầy

thuốc hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị tới nhất.

Nếu thuốc không có tác dụng trong vòng 4 tuần, nên ngưng thuốc và hỏi ý kiến thầy thuốc.

Một đợt điều trị không được kéo dài quá 3 tháng.

**Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?**

Thận trọng khi dùng với sản phẩm có thể gây kích ứng tại chỗ khác, chế phẩm chứa lưu

huy nh, resorcinol hay acid salicylic.

Các sản phẩm chứa benzoyl peroxid có thể làm bạc màu lông, tóc và mắt màu của vải nên hạn

chế để thuốc tiếp xúc với các sản phẩm có màu.

Không được dùng benzoyl peroxid khi phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc tia tử ngoại.

Dùng đồng thời với thuốc chống nắng có chứa acid paraaminobenzoic sẽ làm biến đổi màu da

một thời gian.

Nên tránh sử dụng đồng thời benzoyl peroxid với tretinoin, isotretinoin và tazaroten vì nó có thể làm giảm hiệu quả và làm tăng kích ứng. Nếu cần phải phối hợp điều trị, sản phẩm nên được sử dụng vào những thời điểm khác nhau trong ngày (ví dụ: một vào buổi sáng và buổi tối).



Sử dụng benzoyl peroxid tại chỗ đồng thời với các sản phẩm có chứa sulfonamid có thể khiến da và tóc tím thay đổi màu sắc (vàng/cam).

**Cần làm gì khi một lần quên dùng thuốc?**

Tiếp tục dùng liều với cách dùng như thường lệ.

**Cần bảo quản thuốc này như thế nào?**

Bao quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

**Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:**

Có thể xảy ra tóe vảy da quá nhanh, ban đỏ hoặc phù.

**Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?**

Nếu xảy ra tóe vảy da quá nhanh, ban đỏ hoặc phù, cần ngưng thuốc. Để khắc phục nhanh các tác dụng có hại, có thể đắp gạc lạnh. Sau khi các triệu chứng và các biểu hiện trên đã giảm, có thể dùng thử một cách thận trọng liều lượng thấp hơn nếu cần tăng phân ứng đã xảy ra là do dùng quá liều chứ không phải do dị ứng.

**Nhưng điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?**

Phản ứng nóng rát nhẹ, đỏ, và bong da có thể xảy ra trong lần đầu tiên sử dụng sản phẩm chưa hoạt chất này. Lưu ý có cảm giác hơi bị kích ứng, điều này không phải là do không dung nạp hay dị ứng. Tuy nhiên vẫn nên thử độ nhạy cảm của da trước khi dùng thuốc (bởi nhiều lần lên một bề mặt da nhỏ, trong nhiều ngày liên tục). Các triệu chứng này là vô hại, và thường sẽ biến mất khoảng 1 ngày. Trong trường hợp các phản ứng dị ứng trở nên nặng hơn thì cần giảm tần xuất sử dụng thuốc xuống.

Việc sử dụng thuốc qua liều được khuyến cáo không làm tăng tác dụng điều trị của thuốc mà tăng nguy cơ gặp phải các tác dụng không mong muốn.

Để giảm đến mức tối thiểu hiện tượng bị kích ứng:

- Không bôi thuốc nếu ngứa lan sử dụng trước đã bị kích ứng. Nếu có kích ứng tại chỗ nặng cần ngưng sử dụng thuốc.
- Ngoài trừ có những chỉ định cụ thể, không nên dùng đồng thời với những thuốc bôi tại chỗ khác có tác dụng làm tiêu sưng hay tẩy màu.
- Nên làm vệ sinh da mỗi ngày 1-2 lần là đủ, bằng các sản phẩm tẩy rửa chuyên biệt cho da, không dùng nước hoa hay các sản phẩm có chứa cồn.
- Tránh phơi nắng trong thời gian đầu điều trị, sau đó nếu có phơi nắng phải bôi kem chống nắng.

- Không sử dụng đèn chiếu tia tử ngoại.
- Đặc biệt thận trọng khi bôi thuốc cho những người có màu da sáng hay khi bôi lên những vùng da nhạy cảm như cổ, ngực, quanh mắt, miêng. Nếu tình trạng kích ứng có vẻ nặng hay không dung nạp, nên bôi thuốc thưa ra. Nếu tình trạng ngứa vẫn kéo dài gây khó chịu, nên ngưng bôi thuốc. Nếu vô ý bôi thuốc lên niêm mạc (mắt, miêng, lỗ mũi) hay mí mắt, cần rửa sạch với nhiều nước. Không bôi thuốc lên vết thương chảy máu hay da bị tổn thương.

Cần thận trọng với các trường hợp sử dụng đồng thời các liệu pháp trị mụn khác nhau, vì nguy cơ cộng hưởng các tác dụng phụ và làm triệu chứng trên bệnh nhân trở nên nặng hơn.

*Sử dụng ở phụ nữ có thai:*

Chưa có đầy đủ thông tin về việc sử dụng benzoyl peroxid ở phụ nữ có thai. Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của benzoyl peroxid đối với chức năng sinh sản, khả năng sinh sản, gây quái

thai, nhiệm vụ đọc phổi hoặc sử phát triển ở giai đoạn trước và sau sinh trên động vật. Trong quá trình được sử dụng rộng rãi làm sáng để điều trị mụn trứng cá, ở nồng độ lên đến 10% KI/KI trong nhiều thập kỷ, benzoyl peroxid không có ảnh hưởng trên các thông số này ở người. Tuy vậy, chỉ nên sử dụng cho phụ nữ mang thai khi thật cần thiết.

Sử dụng ở phụ nữ cho con bú:

Chưa có thông tin về việc benzoyl peroxid hoặc chất chuyển hóa của nó có mặt trong sữa mẹ hay không. Ngay cả đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không thể bị loại trừ. Không nên bôi lên ngực để tránh tiếp xúc với trẻ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ?

Nếu có bất kỳ phản ứng không mong muốn nào xảy ra.

"Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ"

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ngày xem xét sửa đổi cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: dd/mm/yyyy

## PHẦN THÔNG TIN DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Hoạt chất:

Anhydrous benzoyl peroxid.....5% (dưới dạng hydrous benzoyl peroxid)

Tá dược: Carbomer 940, edetic acid, polyoxyethylen lauryl ether, natri hydroxid, nước tinh khiết

Mô tả sản phẩm: Gel bôi ngoài da

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuyp 15 g, hộp 1 tuyp 30 g.

Các đặc tính dược lực học:

Nhóm dược lý: Thuốc điều trị bệnh da liễu

Mã ATC: D10AE01

Benzoyl peroxid có tác dụng làm tước vảy da, bong lớp sừng và kháng khuẩn.

Tác dụng kháng khuẩn của benzoyl peroxid có thể do hoạt tính oxi hóa, có tác dụng trên vi khuẩn *Staphylococcus epidermis* và *Propionibacterium acnes*. Tác dụng này rất có ích trên mụn trứng cá, đang bôi tại chỗ benzoyl peroxid 5% được sử dụng rộng rãi và là thuốc đầu tiên để điều trị trứng cá. Benzoyl peroxid còn có tác dụng ức chế hệ vi khuẩn trên da cũng với làm giảm bề mặt các tổ chức nang nhỏ trong nang nang 48 giờ từ khi bôi thuốc nhưng vài ngày sau mới thể hiện trên lâm sàng.

Trùng hợp bị mụn trứng cá nặng, cần dùng thêm tại chỗ clindamycin hoặc clarithromycin để ức chế các vi khuẩn kháng thuốc.

Benzoyl peroxid còn dùng để điều trị nấm trên da như *Tinea pedis*.

Các đặc tính dược động học:

Thuốc hấp thụ qua da khoảng 1,8 mcg/cm<sup>2</sup> hoặc 45% liều dùng trong khoảng 24 giờ. Lượng benzoyl peroxid được hấp thụ sẽ chuyển hoàn toàn thành acid benzoic ở da và được thải trừ

nhánh chóng vào nước tiều. Benzoyl peroxid bôi tại chỗ khuếch tán chọn lọc đến các biểu bì, sau đến từ từ vào đến lớp bì.

**Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định:**

**Chỉ định:**

**Chỉ định:**

Benzoyl peroxid được dùng tại chỗ để điều trị mụn trứng cá.

**Liều dùng và cách dùng:**

Trước khi dùng thuốc, phải rửa sạch và làm khô các vùng có mụn trứng cá hoặc mụn mủ ở mắt, cổ hoặc bất cứ nơi nào khác trên cơ thể.

Bôi một lớp rất mỏng, ngày 1-2 lần. Tốt nhất là nên dùng thuốc vào lúc đi ngủ để thuốc tác dụng qua đêm.

**Chống chỉ định:**

Bệnh nhân quá mẫn cảm với benzoyl peroxid hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

**Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:**

Phan ứng nông rất nhẹ, đỏ, và bong da có thể xảy ra trong lần đầu tiên sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất này. Lúc đầu có thể có cảm giác hơi bị kích ứng, điều này không phải là do không dung nạp hay dị ứng. Tuy nhiên vẫn nên thử độ nhạy cảm của da trước khi dùng thuốc (bôi nhiều lần một bề mặt da nhỏ, trong nhiều ngày liên tục). Các triệu chứng này là vô hại, và thường sẽ biến mất khoảng 1 ngày. Trong trường hợp các phản ứng dị ứng trở nên nặng hơn thì cần giám sát sự xuất hiện của các triệu chứng.

Việc sử dụng thuốc qua liều được khuyến cáo không làm tăng tác dụng điều trị của thuốc mà tăng nguy cơ gặp phải các tác dụng không mong muốn.

Để giám sát đến mức tối thiểu hiện tượng bị kích ứng:

- Không bôi thuốc nếu như ngứa lan sử dụng trực tiếp da bị kích ứng. Nếu có kích ứng tái cho ngứa cần ngưng sử dụng thuốc.

- Ngoài trừ có những chỉ định cụ thể, không nên dùng đồng thời với những thuốc bôi tại chỗ khác có tác dụng làm tiêu sừng hay tẩy màu.

- Nên làm vệ sinh da mỗi ngày 1-2 lần là đủ, bằng các sản phẩm tẩy rửa chuyên biệt cho da, không dùng nước hoa hay các sản phẩm có chứa cồn.

- Tránh phơi nắng trong thời gian đầu điều trị, sau đó nếu có phơi nắng phải bôi kem chống nắng.

- Không sử dụng đèn chiếu tia tử ngoại.

- Đặc biệt thận trọng khi bôi thuốc cho những người có màu da sẫm hay khi bôi lên những vùng da nhạy cảm như cổ, ngực, quanh mắt, miêng. Nếu tình trạng kích ứng có vẻ nặng hay không dung nạp, nên bôi thuốc thưa ra. Nếu tình trạng ngứa vẫn kéo dài gây khó chịu, nên ngưng bôi thuốc. Nếu vô ý bôi thuốc lên niêm mạc (mắt, miêng, lỗ mũi) hay mí mắt, cần rửa sạch với nhiều nước. Không bôi thuốc lên vết thương chảy máu hay da bị tổn thương.

Cần thận trọng với các trường hợp sử dụng đồng thời các liều pháp trị mụn khác nhau, vì nguy cơ cộng hưởng các tác dụng phụ và làm triệu chứng trên bệnh nhân trở nên nặng hơn.

**Sử dụng ở phụ nữ có thai:**

Chưa có đầy đủ thông tin về việc sử dụng benzoyl peroxid ở phụ nữ có thai. Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của benzoyl peroxid đối với chức năng sinh sản, khả năng sinh sản, gây quái thai, nhiễm độc phôi hoặc sự phát triển ở giai đoạn trước và sau sinh trên động vật. Trong quá trình được sử dụng rộng rãi làm sáng để điều trị mụn trứng cá, ở nồng độ lên đến 10% KI/KI trong nhiều thập kỷ, benzoyl peroxid không có ảnh hưởng trên các thông số này ở người. Tuy vậy, chi nên sử dụng cho phụ nữ mang thai khi thật cần thiết.

*Nguyễn Ngọc Anh*

TRƯỜNG PHÒNG  
TƯỞNG



Ngày xem xét sửa đổi cấp nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: dd/mm/yyyy

Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất:

Bao quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng của thuốc và điều kiện bảo quản:

Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo khác của thuốc (nếu có): không có bao cao.

ra la do dùng quá liều chứ không phải do dị ứng.

giảm, có thể dùng thử một cách thận trọng liều lượng thấp hơn nếu cho rằng phản ứng đã xảy

các tác dụng có hại, có thể đáp gạc lành. Sau khi các triệu chứng và các biểu hiện trên đã

Nếu xảy ra tác vậy da quá nhanh, ban đỏ hoặc phù, cần ngưng thuốc. Để khác phục nhanh

Quả liều và cách xử trí:

Một đợt điều trị không được kéo dài quá 3 tháng.

Nếu thuốc không có tác dụng trong vòng 4 tuần, nên ngưng thuốc và hỏi ý kiến thầy thuốc.

thuốc hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị tốt nhất.

ngứa nhiều, đỏ, nóng bưng, sưng phồng hoặc kích ứng, thì ngưng thuốc và hỏi ý kiến thầy

hết bôi thử trên một vùng nhỏ. Nếu có kích ứng hoặc khô da thì nên giảm số lần dùng. Nếu bị

Cần xác định xem người bệnh có mắc cảm với benzoyl peroxid hay không, bằng cách trước

không may tiếp xúc xây ra, phải rửa kỹ với nước.

Thuốc chỉ được dùng ngoài. Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt, niêm mạc, môi và miệng. Nếu

Hướng dẫn cách xử trí ADR

Một số tác dụng không mong muốn chưa rõ tần suất gặp: sưng mắt.

li gặp,  $1/1000 \leq ADR < 1/100$ : dị ứng da.

chứng có liên quan tới viêm da)

Thường gặp,  $1/100 \leq ADR < 1/10$ : ngứa da, cảm giác da đau râm ran, kích ứng (các triệu

Rất thường gặp,  $1/100 \leq ADR < 1/10$ : khô da, ban đỏ, bong tróc da, da kích ứng nóng đỏ.

Tên da và các rối loạn ở các mô dưới da:

Tác dụng không mong muốn (nếu có):

da và tốc tâm thời thay đổi màu sắc (vàng/cam).

Sử dụng benzoyl peroxid tại chỗ đồng thời với các sản phẩm có chứa sulfonamid có thể khiến

(tôi).

được sử dụng vào những thời điểm khác nhau trong ngày (ví dụ: một vào buổi sáng và buổi

thể làm giảm hiệu quả và làm tăng kích ứng. Nếu cần phải phối hợp điều trị, sản phẩm nên

Nên tránh sử dụng đồng thời benzoyl peroxid với tretinoin, isotretinoin và tazaroten vì nó có

một thời gian.

Dùng đồng thời với thuốc chống nắng có chứa acid paraaminobenzoic sẽ làm biến đổi màu da

Không được dùng benzoyl peroxid khi phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc tia tử ngoại.

chê để thuốc tiếp xúc với các sản phẩm có màu.

Các sản phẩm chứa benzoyl peroxid có thể làm bạc màu lông tóc và mất màu của vải nên hạn

huyneh, resorcinol hay acid salicylic.

Thận trọng khi dùng với sản phẩm có thể gây kích ứng tại chỗ khác, chế phẩm chứa lưu

Trong tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Không ảnh hưởng.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

ngực để tránh tiếp xúc với trẻ

hay không. Ngay cả đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không thể bị loại trừ. Không nên bôi lên

Chưa có thông tin về việc benzoyl peroxid hoặc chất chuyển hóa của nó có mặt trong sữa mẹ

Sử dụng ở phụ nữ cho con bú.

