


<https://www.thuocngocanh.com/>

TIV 38832 (7/19)

Q/DB-197-19

**MẪU NHÃN HỘP SIRO VIRELSEA**  
(Hộp 1 lọ siro 100 ml) - Tỷ lệ 60%  
Kích thước hộp: 60 x 60 x 120 mm



NGƯỜI THIẾT KẾ

*Quang*

PHÒNG NCPT

*Khue*

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**KHÔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 - PHARBACO**

**GIÁM ĐỐC**

*Hà Thị Thanh Hoa*

<https://nhathuocngocanh.com/>

MẪU NHÃN LỌ SIRO VIRELSEA  
(LỌ SIRO 100 ML)  
Kích thước nhãn lọ: 105 x 50 mm



NGƯỜI THIẾT KẾ

*[Handwritten signature]*

PHÒNG NCPT

*[Handwritten signature]*

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019





GIÁM ĐỐC

*Hà Thị Thanh Hoa*

<https://nhathuocngocanh.com/>

Gói Siro 10ml  
Kích thước: 102 x 60mm

 <p>Rx: Thuốc kê đơn</p> <p><b>Viresea</b></p> <p>Siro 10ml</p> <p>Mỗi gói 10 ml siro có chứa 0,6 g siro đặc hòa hợp được liều tương ứng với: Dược hệ chitin / Hemicellulose ... 4500mg Chất ngọt (Fructus Evodiae) ... 750mg Chất nhầy (Mucosa Eucalypti) ... 750mg Tá dược vừa đủ 1 gói</p> <p>PHARMASIP Nhà sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 - PHARIBICO</p>	<p><b>CHỈ ĐỊNH:</b> Sốt từ viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan B, viêm gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, đau hạ sườn phải, ngứa, vàng da, bị đại tiểu tiện, táo bón.</p> <p>Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày.</p> <p>Trị viêm và hỗ trợ điều trị xơ gan.</p> <p><b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:</b> Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 10 ml/lần, ngày 3 lần.</p> <p>Trẻ em dưới 12 tuổi: Uống 5-10 ml/lần, ngày 1-3 lần.</p> <p>Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.</p> <p>SEK: ..... TIÊU CHUẨN TCS</p> <p>Số lô SX: nmmn Ngày SX: dmmmy HĐ: dmmmy</p> <p></p> <p>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 - PHARIBICO Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - HÀ NỘI Sản xuất tại: Thanh Xuân - Sóc Sơn - HÀ NỘI</p>
--	--

NGƯỜI THIẾT KẾ



PHÒNG NCPT




Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

**KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH**  
ĐƯỢC PHẠM  
TRUNG ƯƠNG  
PHARMASIP  
GIÁM ĐỐC



**MẪU NHÃN HỘP VIRELSEA**  
(Hộp 30 gói x 10 ml) - Tỷ lệ 60%  
Kích thước hộp: 110 x 100 x 90 mm



NGƯỜI THIẾT KẾ  
*Thanh*

PHÒNG NCPT  
*Thanh*

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

KT. TÔNG GIAM ĐỐC

GIAM ĐỐC

*Phạm Thanh Hoa*



**Rx: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC**

**Tên thuốc: VIRELSEA**

**Khuyến cáo:**

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Đề xa tâm tay trẻ em”

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

**Thành phần:** Mỗi 10ml chứa:

Diệp hạ châu ( <i>Herba Phyllanthi urinariae</i> )	4,5g
Chua ngút ( <i>Fructus Embeliae</i> )	0,75g
Cò nhọ nôi ( <i>Herba Ecliptae</i> )	0,75g
Tá dược vừa đủ	10ml

(Tá dược gồm: Acid citric, natri citrat, nipagin, nipasol, ethanol 96%, đường trắng, natri saccharin, nước tinh khiết)

**Dạng bào chế:** Sirô

**Chỉ định điều trị:**

Điều trị viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan B.

Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.

Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày.

Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

**Liều lượng và cách dùng:**

**Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:** Uống mỗi lần 10ml/lần, ngày 3 lần.

**Trẻ em dưới 12 tuổi:** Uống mỗi lần 5-10ml/lần, ngày 1-3 lần.

Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

**Chống chỉ định:**

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Người bị viêm tắc mật.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Người thể hàn, chủ hàn.

**Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**

Không dùng cho người viêm tắc mật.

Thận trọng với nam giới có ý định sinh con.

**Thời kỳ mang thai, cho con bú:**

Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

**Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:**

Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

**Tương tác, tương kỵ với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:**

Hiện nay chưa có tương tác nào xảy ra với các thuốc khác.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR):**


Thuốc chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn.

**Quá liều và cách xử trí:**

Chưa có báo cáo về các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng thuốc quá liều.

**Quy cách đóng gói:**

Hộp 30 gói x 10ml. Hộp 1 lọ nhựa hoặc lọ thủy tinh tối màu x 100ml, có kèm theo cốc đong và hướng dẫn sử dụng.



<https://nhathuocngocanh.com/>

BL2-10/07/2019

**Điều kiện bảo quản:**

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.**

**Tiêu chuẩn sử dụng:** TCCS

**TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT:**

**CƠ SỞ SẢN XUẤT CAO DƯỢC LIỆU:**

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Áp 2 – Xã Tân Thành Tây- Huyện Củ Chi- TP. Hồ Chí Minh

**CƠ SỞ SẢN XUẤT THÀNH PHẨM:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội.

ĐT: 84-24-38454561; Fax: 84-24-38237460

Sản xuất tại: Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội.



TU QUẢN TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Ngọc Anh*

