

Tờ hướng dẫn sử dụng

VITAR-JUNIOR

Thành phần:

Mỗi ống 10 mL chứa:

Arginin aspartat.....1000,0 mg

Lysin hydroclorid.....200,0 mg

Cyproheptadin hydroclorid.....0,5 mg

Các thành phần khác vừa đủ 10 mL.

Cơ chế tác dụng:

- **Dung dịch uống VITAR - JUNIOR** là kết hợp giữa arginin aspartat, lysin hydroclorid, cyproheptadin:
- Arginin aspartat được cấu tạo bởi hai acid amin thiết yếu của cơ thể là L-arginin và L-aspartat. Tác dụng của arginin aspartat là tổng hợp tác dụng của hai acid amin này. Arginin là acid amin tham gia vào chu trình tạo urê ở gan, có tác dụng điều hòa nồng độ amoniac trong máu tăng trong một số bệnh gan, thúc đẩy quá trình tổng hợp protein của cơ thể, hỗ trợ điều trị các rối loạn chức năng gan, các chứng biếng ăn, khó tiêu. L-aspartat giúp cơ thể tăng hấp thu chất khoáng. Kết hợp arginin và aspartat giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, chu trình đồng hóa trong cơ thể, sử dụng nhiều năng lượng nên tạo cảm giác đói, giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cường tổng hợp protein, giúp hồi phục và phát triển thể chất, tái thiết các mô bị tổn thương.
- Lysin là một acid amin thiết yếu mà cơ thể không thể tổng hợp được. Nó giúp tăng cường hấp thu và duy trì canxi, ngăn cản sự bài tiết canxi ra ngoài cơ thể, lysin có tác dụng tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa bệnh loãng xương.
- Lysin còn là thành phần của nhiều loại protein, là yếu tố quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch, phát triển men tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng chuyển hóa, hấp thu tối đa dinh dưỡng và phát triển chiều cao.
- Cyproheptadin có tác dụng kích thích sự thèm ăn, làm tăng cảm giác ngon miệng ở trẻ biếng ăn.

Công dụng:

- Hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác ngon miệng.
- Giúp bồi bổ cơ thể trong trường hợp suy nhược về thể chất.

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ em trên 24 tháng tuổi tiêu hóa kém, biếng ăn.
- Người mệt mỏi, ăn ngủ kém, suy nhược cơ thể, người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.

Liều lượng – cách dùng:

Cách dùng: dùng uống.

- Người lớn: 1 ống/ lần x 2 lần/ngày.

- Trẻ em: uống 1 ống /lần x 1 lần/ngày.

Lưu ý:

Mỗi ống uống có chứa 5g đường, cần lưu ý khi sử dụng cho bệnh nhân phải kiêng đường và muối.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Qui cách đóng gói:

Đóng ống 10 ml. Hộp 4 vỉ x 5 ống.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, không dùng khi quá hạn sử dụng.

Lưu ý:

“Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.”

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất: BOSTON PHARMA

43 đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ: (0650) 3.769. 606.

Email: boston@bostonpharma.com.vn.