

# YuhanAntiplamine S Lotion

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Để thuốc xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn in trên bao bì.

**THÀNH PHẦN :** Mỗi chai (100ml) có chứa:

**HOẠT CHẤT :**

Methyl salicylate	20g
L-Menthol	6g

**Tá dược :** Lanolin lỏng, Paraffin nhẹ lỏng, Sorbitan monostearat, Polyoxyethylene sorbitan monostearat (Polysorbate 60), Triethanolamin (Trolamin), Carbomer 941, Nước tinh khiết.

**MÔ TẢ :** Chất lỏng đồng nhất màu trắng có mùi tinh dầu bạc hà

**DƯỢC LỰC HỌC/DƯỢC ĐỘNG HỌC :**

**Dược lực học :**

Methyl salicylat và Menthol là hai chất có tác dụng giảm đau. Thoa kem lên chỗ đau và xoa bóp kỹ.

Những hoạt chất của thuốc sẽ thấm nhanh và làm dứt cơn đau.

**Dược động học :**

Hai hoạt chất Methyl Salicylat và L-Menthol được hấp thu qua da rất dễ dàng, thấm thấu nhanh lên vùng bị đau.

## **CHỈ ĐỊNH :**

Thuốc được dùng để giảm đau hoặc chống viêm trong những trường hợp sau:

- 1) Bong gân, thâm tím, đau cơ, đau khớp, đau do gãy xương, đau lưng, đau vai, đau dây thần kinh, đau do thấp khớp.
- 2) Côn trùng cắn.
- 3) Sưng đau do lạnh.

## **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG :**

Bôi một lượng thích hợp vào vùng da cần điều trị 1~4 lần/ngày

Mát-xa nhẹ nhàng sau khi bôi thuốc.

## **CHỐNG CHỈ ĐỊNH :**

- 1) Tránh thoa thuốc vào mắt, vùng quanh mắt và màng nhầy.
- 2) Không thoa lên vùng da bị viêm do eczema, vùng da bị trầy xước và vùng da mẫn cảm.

## **CÁC CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG :**

Thuốc cần được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân sau:

- 1) Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với thuốc hoặc mỹ phẩm (ví dụ, viêm da do phát ban, ngứa, ..).
- 2) Bệnh nhân và người nhà của họ có thể trạng dị ứng.
- 3) Bệnh nhân bị vết xước và vết thương hở.
- 4) Bệnh nhân đang được điều trị bệnh dưới sự giám sát của bác sĩ.
- 5) Bệnh nhân bị tiểu đường hoặc rối loạn tuần hoàn.
- 6) Trẻ em dưới 12 tuổi.

Các thận trọng chung

- 1) Dùng đúng liều và đúng cách.
- 2) Nếu trẻ em cần phải dùng thuốc, phải có sự giám sát của người lớn.
- 3) Sau 5~6 ngày dùng thuốc, nếu các triệu chứng không cải thiện, ngừng sử dụng thuốc và thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.

**Thận trọng khi sử dụng**

- 1) Thuốc chỉ được dùng ngoài
- 2) Tránh thoa thuốc vào mắt. Nếu thuốc dính vào mắt, cần phải rửa sạch ngay với nước. Trong trường hợp nặng hơn, cần liên hệ với bác sĩ nhãn khoa.
- 3) Không dán băng lên vùng thoa thuốc. Không để vùng thoa thuốc tiếp xúc với nước nóng hoặc nhiệt.

**Thận trọng khi bảo quản**

- 1) Để xa tầm tay trẻ em.
- 2) Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và bảo quản trong lọ kín. Nếu có thể, bảo quản ở nơi khô mát, ở nhiệt độ phòng.
- 3) Để tránh sử dụng nhầm và duy trì chất lượng thuốc, không được thay đổi bao bì đựng thuốc.

**TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC :**

Chưa có báo cáo đáng tin cậy.

**SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ :**

Không có chống chỉ định tuyệt đối, mặc dù vậy không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi không thực sự cần thiết.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :**

Nếu xuất hiện các triệu chứng phát ban, ngứa khi dùng thuốc này, ngừng dùng thuốc và thông báo ngay với bác sĩ hoặc dược sĩ.

Thuốc có thể gây nóng rát sau khi bôi.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ :**

Yuhanantiphlamine S Lotion dùng để bôi lên da. Không được uống. Chưa có hiện tượng quá liều nào được báo cáo khi dùng Yuhanantiphlamine S Lotion. Nếu bệnh nhân vô tình uống thuốc này, cần đưa ngay tới bệnh viện dù chưa thấy xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN :** Bảo quản trong bao bì kín, ở nhiệt độ phòng

**DẠNG BÀO CHẾ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :** 100ml/lọ /hộp Carton

**TIÊU CHUẨN :** Nhà sản xuất

**HẠN DÙNG :** 3 năm kể từ ngày sản xuất

**SẢN XUẤT BỞI :**

**Yuhan Corporation**

Địa chỉ : 219. Yeongudanji-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea