



MẪU NHÃN VÀ TỜ HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC

Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

6A 3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: **ZINC 15 MEYER**

Dạng thuốc: Viên nén.

Nồng độ, hàm lượng:

-Kẽm gluconat 105 mg

(Tương đương với 15 mg kẽm)

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.

Loại hình đăng ký: Đăng ký lần đầu.



Năm 2012

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/6/2013

MẪU ĐĂNG KÝ VỊ THUỐC ZINC 15 MEYER




TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nền

MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC ZINC 15 MEYER

Handwritten signature



ĐS. Nguyễn Văn Nền

MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC ZINC 15 MEYER

Tiêu chuẩn: TCCS	
ZINC 15 MEYER	
THÀNH PHẦN:	
Kẽm gluconat	105 mg
(Tương đương với 15 mg kẽm).	
Tá dược: lactose, tinh bột mì, polyvinyl pyrolidon, natri starch glycolat, magnesi stearat vừa đủ 1 viên.	
DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén.	
CHỈ ĐỊNH:	
Bổ sung kẽm trong trường hợp thiếu kẽm	
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:	
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.	
THẬN TRỌNG:	
-Tránh dùng viên kẽm trong giai đoạn loét dạ dày tá tràng tiến triển và nôn ói cấp tính.	
-Dùng kẽm lâu dài liều cao bằng đường uống dẫn đến thiếu hụt đồng, bệnh thiếu máu do thiếu sắt và giảm bạch cầu trung tính.	
TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:	
Phụ nữ mang thai và cho con bú chỉ sử dụng thuốc khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ có thể xảy ra và phải tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ.	
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:	
Tác dụng không mong muốn hay xảy ra nhất với các muối kẽm khi dùng đường uống liên quan đến dạ dày ruột bao gồm đau bụng, khó tiêu, tình trạng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, kích thích dạ dày và viêm dạ dày. Những tác dụng phụ này rõ ràng hơn nếu uống lúc dạ dày rỗng và giảm đi khi dùng vào các bữa ăn.	
<i>Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc</i>	
TƯƠNG TÁC THUỐC:	
Sự hấp thu kẽm có thể giảm bởi penicillamin, tetracyclin và các chế phẩm có chứa sắt, phospho. Việc bổ sung kẽm làm giảm hấp thu đồng, sắt, kháng sinh nhóm quinolon, penicillamin và tetracyclin.	
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:	
Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 1 - 2 lần, uống trước bữa ăn.	
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:	
-Quá liều cấp tính các muối kẽm gây loét dạ dày do hình thành muối kẽm clorid bởi acid dạ dày.	
-Xử trí: chỉ định muối kiềm carbonat, uống sữa hoặc than hoạt tính. Không nên dùng chất gây nôn hoặc thực rửa dạ dày.	
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.	
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.	
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp chứa 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén.	
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.	
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.	



MEYER-BPC
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phủ Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre-Việt Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

ĐS. Nguyễn Văn Nền