



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 23-03-2016

Ph

Lọ 50g

TAM THẮT BỘT

PHÚC HƯNG

THÀNH PHẦN:
Bột Tam thất 50g
CÔNG DỤNG:
Bồi bổ cơ thể, bổ máu, cầm máu, tan máu tụ, chống viêm, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 3g dưới dạng ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với mật ong.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho phụ nữ có thai.

Tiêu chuẩn: TCCS



CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04 33826222 * Fax: 04 33978024

Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

SBK:
Số là SX:
Ngày SX:
HD





Lọ 100g

TAM THẮT BỘT

PHÚC HƯNG

THÀNH PHẦN:

Bột Tam thất 100g

CÔNG DỤNG:

Bồi bổ cơ thể, bổ máu, cầm máu, tan máu tụ, chống viêm, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 3g dưới dạng ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với mật ong.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho phụ nữ có thai.

Tiêu chuẩn: TCCS

SBK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD



CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM





TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

TAM THẤT BỘT PHÚC HƯNG

Thành phần:

- Lọ 50g : Bột Tam thất (*Pulveres radicis notoginseng*).....50g
- Lọ 100g : Bột Tam thất (*Pulveres radicis notoginseng*).....100g

Dạng bào chế: Thuốc bột.

Quy cách đóng gói: Lọ 50g, lọ 100g.

Công dụng:

Bồi bổ cơ thể, bổ máu, cầm máu, tan máu tụ, chống viêm, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3g dưới dạng ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với mật ong.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



**TS. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Lỗ Minh Hùng