https://nhathuocngocanh.com/

227/137

MẪU NHÃN

Tỷ lệ: 1:2

1.5 g

Rx Thuốc bán theo đơn

Glucose Kabi 30%

Dung dịch tiêm

Mỗi ống chứa 1,5 g Glucose khan

T.M.

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng
và các thông tin khác:
Xem toa hướng dẫn bên trong hộp

Hộp 50 ống x 5 mL

FRESENIUS KABI BIDIPHAR

Glucose Kabi 30%
Glucose khan
1,5 g/5 mL
T.M.
Số lô SX : HD:
CTCP FRESENIUS KABI BIDIPHAR

Rx Glucose Kabi 30%
Dung dịch tiêm
1.5 g

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Bảo quản: Nhiệt độ không quá 30°C

Rx Glucose Kabi 30%
Solution for injection
1.5 g

Số ĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Manufactured by:
Fresenius Kabi Bidiphar Joint-Stock Company
Area 8B, Nhon Phu Ward, Qui Nhon City, Binh Dinh, Viet Nam

Rx Glucose Kabi 30%
Dung dịch tiêm
1.5 g

Sản xuất bởi:
Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Bidiphar
Khu vực 8, P. Nhơn Phú, TP.Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Rx Glucose Kabi 30%
Solution for injection
1.5 g

Each ampoule contains 1.5 g Glucose anhydrous
Read the leaflet for further information

I.V.
GMP - WHO

50 x 5 mL

FRESENIUS KABI BIDIPHAR

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 20/12/12

https://nhathuocngocanh.com/

THUỐC TIÊM

GLUCOSE KABI 30%

**** Thành phần:***

Glucose khan ..... 1,5 g

Nước cất pha tiêm vừa đủ ..... 5 ml

**** Dạng bào chế:*** Dung dịch tiêm.

**** Qui cách đóng gói:*** Hộp 50 ống x 5 ml.

**** Các đặc tính dược lực học:***

- Glucose có tác dụng hỗ trợ calo, cứ 100g Glucose cung cấp 400 kilocalo.
- Glucose là đường đơn 6 carbon, dùng tiêm tĩnh mạch để điều trị thiếu hụt đường, dùng cùng với các dung dịch điện giải để phòng và điều trị mất nước do ỉa chảy cấp, điều trị chứng hạ đường huyết.

**** Các đặc tính dược động học:*** Glucose chuyển hóa thành carbon dioxyd, nước và đồng thời giải phóng ra năng lượng.

**** Chỉ định:***

- Thiếu hụt carbohydrat.
- Hạ đường huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng chuyển hóa khi bị stress hay chấn thương.

**** Liều dùng, cách dùng:***

- Tiêm tĩnh mạch chậm từ 5 ml – 20 ml/lần. Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
- Liều glucose tối đa khuyên dùng là 500-800 mg/kg thể trọng/giờ.

**** Chống chỉ định:***

- Người bệnh không dung nạp được glucose, mất nước nhược trương nếu chưa bù đủ các chất điện giải.
- Ứ nước, Kali huyết hạ, hôn mê tăng thẩm thấu, nhiễm toan.
- Người bệnh vô niệu, người bệnh bị chảy máu trong sọ hoặc trong tủy sống.
- Mê sảng rượu kèm mất nước, ngộ độc rượu cấp.
- Không được dùng dung dịch glucose cho người bệnh sau cơn tai biến mạch máu não vì đường huyết cao ở vùng thiếu máu cục bộ chuyển hóa thành acid lactic làm chết tế bào não.

**** Thận trọng:***

- Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng nước và các chất điện giải. Cần bổ sung các chất điện giải nếu cần.
- Không truyền dung dịch glucose cùng với máu qua một bộ dây truyền vì có thể gây tan huyết và tắc nghẽn.
- Truyền glucose vào tĩnh mạch có thể dẫn đến rối loạn dịch và điện giải như hạ kali huyết, hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết
- Truyền kéo dài hoặc nhanh một lượng lớn dung dịch glucose ưu trương có thể gây mất nước tế bào do tăng glucose huyết.
- Không được truyền dung dịch glucose ưu trương cho người bệnh bị mất nước vì tình trạng bị mất nước sẽ nặng thêm do bị lợi niệu thẩm thấu.
- Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân bị đái tháo đường (truyền nhanh có thể dẫn đến tăng glucose huyết), bệnh nhân bị suy dinh dưỡng,thiếu thiamin, không dung nạp glucose, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, sốc, chấn thương.

**** Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú:*** Sử dụng an toàn.

**** Người lái xe và vận hành máy:*** Không ảnh hưởng.

**** Tương tác thuốc:*** Hiện chưa tìm thấy trong các Dược thư.

**** Tác dụng không mong muốn:***

- Tiêm dung dịch ưu trương vào tĩnh mạch có thể gây đau tại chỗ, kích ứng tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch.
- Rối loạn nước và chất điện giải (hạ kali – huyết, hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết).
- Mất nước do hậu quả của đường huyết cao.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**** Quá liều và cách xử trí:***

- Biểu hiện: tăng glucose huyết, rối loạn cân bằng điệngiải, phù.
- Xử trí: Giảm liều và/hoặc tiêm insulin, nếu đường huyết tăng cao hoặc có đường niệu; Điều chỉnh cân bằng nước và điện giải; Điều chỉnh thể tích dịch truyền và tốc độ truyền

**** Hạn dùng:*** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn dùng (in trên nhãn ống, hộp).

Nếu quan sát thấy dung dịch vẩn đục thì không được sử dụng.

**** Bảo quản:*** Nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Sản xuất tại:
Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Bidiphar
Khu vực 8 – P. Nhơn Phú – Tp Qui Nhơn – Việt Nam
Tel: 056. 2210645 - Fax: 056. 3946688

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh