

Lần đầu: 23 -03- 2016



[Signature]

Xuyên khung.....	400mg
Ngưu tất.....	300mg
Ich mẫu.....	200mg
Đan sâm.....	200mg
Tá dược.....	vớ 1 viên

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

SDK:

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

HỘP 2 VI x 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H



P/H

PHUC HUNG

BỔ HUYẾT

HOẠT HUYẾT - THÔNG MẠCH

CHỈ ĐỊNH:

Bổ huyết - Hoạt huyết - Thông mạch

Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

SỐ LỘ SX:

Ngày SX:

HD :

BỘ HUỆT
HOẠT HUỆT - THÔNG MẠCH



PHUC HUNG



H/

PH
THÔNG MẠCH
HOẠT HUYẾT

HỘ P 2 VỊ x 20 VIỆN NÊN BAO DƯỠNG



CÔNG TY TNHH ĐỒNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung,
 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cầm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024



THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Đường quy.....108,3mg

Xuyên khung.....400mg

Cao đặc được liệu.....175mg

Ngưu tất.....300mg

Tương đương với:

Ich mẫu.....200mg

Đường quy.....391,7mg

Đan sâm.....200mg

Sinh địa.....400mg

Tả được.....vd 1 viên

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

SDK:

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

HỘP 5 VI x 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

BỔ HUYẾT

HOẠT HUYẾT - THÔNG MẠCH

PHUC HUNG

PHUC HUNG

PHUC HUNG

CHỈ ĐỊNH:

Bổ huyết - Hoạt huyết - Thông mạch

Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

BỔ HUYẾT

HOẠT HUYẾT - THÔNG MẠCH

PHUC HUNG

PHUC HUNG

PHUC HUNG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Bột Đường quy (*Pulveres radices angelicae sinensis*) : 108,3mg

Cao đặc dược liệu (*Extractum*) : 175mg

tương đương với:

Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*) : 391,7mg

Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*) : 400mg

Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) : 400mg

Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) : 300mg

Ích mẫu (*Herba Leonuri japonici*) : 200mg

Đan sâm (*Radix Salviae miltiorrhizae*) : 200mg

Tá dược (tinh bột sắn, Avicel, calci carbonat, magnesi stearat, đường kính, talc, PVP K30, nipagin, nipasol, màu erythrosin, sắt oxyd đỏ, sáp ong trắng, carnauba wax, ethanol 96%, nước tinh khiết) vừa đủ 1 viên



Dạng bào chế: Viên nén bao đường.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên, hộp 1 vỉ x 20 viên, hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên.

Chỉ định:

Bổ huyết - hoạt huyết - thông mạch.

Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Đỗ Minh Hùng