

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

(Bổ sung lần 1)

Tên thuốc :

SORBITOL 5 g

Dạng thuốc :

THUỐC BỘT

Hàm lượng cho 1 gói 5 g:

Sorbitol 5 g

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

38/132

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc :

SORBITOL 5 g

Dạng thuốc :

THUỐC BỘT

Hàm lượng cho 1 gói 5 g:

Sorbitol 5 g

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis Nguyễn Văn Cừ – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis Nguyễn Văn Cừ – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

* Nhãn trên gói 5 g thuốc bột:

GMP - WHO  GÓI 5 g THUỐC BỘT SACHET OF 5 g POWDER  DIG PHARMA	 Sản xuất bởi: DIG PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ www.digpharma.com.vn Tư Vấn Khách Hàng 0710.3899000 điều kiện bảo quản: nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C. tiêu chuẩn: TCCS. THÀNH PHẦN: Sorbitol 5 g CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng táo bón, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. INDICATIONS - CONTRAINDICATIONS DOSAGE & ADMINISTRATION: Please see the enclosed leaflet. Số lô SX: HD:
--	---

* Nhãn trên hộp 20 gói x 5 g thuốc bột:

Sorbitol
5g
Symptomatic treatment of constipation,
gastrointestinal disturbances, dyspepsia

BOX OF 20 SACHETS x 5 g POWDER



GMP - WHO

Sorbitol
5g
Điều trị triệu chứng táo bón,
rối loạn tiêu hóa, khó tiêu

HỘP 20 GÓI x 5 g THUỐC BỘT



DHG PHARMA

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

THÀNH PHẦN:

Sorbitol 5g

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng táo bón, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH - LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Tư Vấn Khách Hàng
☎ 0710.3899000



Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
263 Bx. Nguyễn Văn Cội, P. An Hòa, Q. Minh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 • Fax: (0710) 3895209
www.dhgpharma.com.vn

GMP - WHO

Sorbitol
5g
Symptomatic treatment of constipation,
gastrointestinal disturbances, dyspepsia

BOX OF 20 SACHETS x 5 g POWDER



DHG PHARMA

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
STORAGE CONDITIONS: STORE IN A DRY PLACE,
NOT EXCEEDING 30°C.
SPECIFICATIONS: MANUFACTURER'S.

COMPOSITION:

Sorbitol 5g

INDICATIONS:

Symptomatic treatment of constipation, gastrointestinal disturbances, dyspepsia.

CONTRAINDICATIONS - DOSAGE & ADMINISTRATION

Please see the enclosed leaflet.

SDK (Reg. No.):



Ngày SX - Mfg. date:

Số lô SX - Batch No.:

HĐ - Exp. date:

* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:



Sorbitol

5g

CÔNG THỨC:

Sorbitol 5 g

DẠNG BÀO CHẾ:

Thuốc bột.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 20 gói x 5 g.

TÍNH CHẤT:

Sorbitol là chất có nhiều nhóm hydroxyl, có tác dụng thúc đẩy sự hydrat - hóa các chất chứa trong ruột. Ngoài ra, Sorbitol còn kích thích tiết cholecystokinin - pancreazym, tăng nhu động ruột, làm loãng phân nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng táo bón, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân, người không dung nạp fructose do di truyền.

THẬN TRỌNG: Không nên sử dụng thuốc nhuận tràng lâu dài. Điều trị táo bón bằng thuốc chỉ để hỗ trợ trong điều trị bằng chế độ ăn uống.

Đối với người bị bệnh kết tràng, tránh dùng lúc đói và cần giảm liều.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa có những dữ liệu nghiên cứu sử dụng Sorbitol cho những đối tượng này.

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Sorbitol rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng lúc, do đó có thể làm giảm sự hấp thu của những thuốc này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gây tiêu chảy, đau bụng nhất là ở bệnh nhân bị bệnh kết tràng chức năng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Pha 1 gói trong ½ cốc nước.

* Điều trị triệu chứng khó tiêu: uống trước bữa ăn hoặc khi có triệu chứng khó tiêu.

Người lớn: uống 1 - 3 gói/ngày.

* Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em ½ liều người lớn.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng
0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Diệp