https://nhathuocngocanh.com/

NHÀ THUỐC NGỌC ANH
VÌ SỨC KHỎE MỌI NGƯỜI

IN 0126 R3

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
Để xa tầm tay của trẻ em.

NEOPEPTINE® Thuốc nước

THÀNH PHẦN

Mỗi 5 ml (một muỗng cà phê) thuốc nước Neopeptine chứa:

Alpha amylase (Vi khuẩn 1:800)	100	mg
Papain U.S.P.	50	mg

Tá dược: Dihydrat clorua calci BP, Methyl hydroxybenzoat BP, Propyl hydroxybenzoat BP, Benzoat natri BP, Saccharin natri BP, Propylen glycol BP, Glycerin BP, Màu caramel USP, Hương kem soda American, Hương Vanilla tiêu đậm, Acid hydrochloric BP, Hydroxid natri BP, Hyflosupercel INF, Nước cất BP.

TÍNH CHẤT

Alpha amylase là một men tiêu chất ngọt được điều chế từ biến chủng của B. subtilis không gây bệnh. Alpha amylase cắt nhỏ tinh bột và polysaccharid bằng cách tấn công bừa vào mối nối alpha-1,4-glucosidic cho ra các dextrin oligosaccharid và monosaccharid. *Papain* là một men tiêu đạm được chế từ quả đu đủ xanh. Ở nhiệt độ cơ thể, papain tác động trong phạm vi pH rộng (pH từ 5 đến 9). Papain gồm papain và chymopapain thủy phân được các protein, polypeptid, đặc biệt là các mối nối các acid amin cơ bản hay leucin hay glycin cho ra các peptid.

CHỈ ĐỊNH

Chán ăn, khó tiêu, không tiêu, trướng hơi, sình bụng, đi tiêu phân sống. Suy dinh dưỡng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tiền sử mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Viêm tụy cấp. Bệnh về tụy mạn tính.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 5 ml (1 muỗng cà phê), hai lần mỗi ngày.

Trẻ em trên một tuổi: mỗi ngày 5 ml (1 muỗng cà phê), chia làm hai liều.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi: 0,5 ml (khoảng 12 giọt) mỗi ngày uống một lần hay chia làm 2 liều. HOẶC theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Có thể hòa thuốc với một ít nước và uống sau mỗi bữa ăn.

LẮC ĐỀU TRƯỚC KHI DÙNG.

THẬN TRỌNG: Không dùng thuốc quá hạn ghi trên nhãn.

Phụ nữ mang thai: Chưa biết rõ thuốc có gây hại cho bào thai khi dùng cho phụ nữ mang thai hoặc có thể ảnh hưởng đến việc sinh nở hay không. Phụ nữ đang mang thai chỉ dùng khi thực sự cần thiết.

Phụ nữ đang cho con bú: Vì liều dùng của người lớn là cao đối với trẻ nhỏ và chưa biết rõ thuốc có qua sữa mẹ hay không, bà mẹ đang cho con bú nên thận trọng khi dùng thuốc này.

TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc nước Neopeptine được dung nạp tốt. Chỉ ở liều cao quá hoặc khi dùng quá kéo dài mới có thể gây rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên alpha amylase chế từ B. Subtilis lại an toàn. Các tác dụng phụ thường được báo cáo nhất chủ yếu là ở hệ tiêu hóa. Các loại phản ứng dị ứng cũng được quan sát thấy ít hơn. Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: *Các thuốc kháng acid:* Calci carbonat hay manhê hydroxid có thể làm mất tác dụng có ích của các loại men.

QUÁ LIỀU: Liều quá cao có thể gây buồn nôn, đau bụng quặn hoặc tiêu chảy. Liều rất cao thường đi kèm với tình trạng tăng acid uric niệu và tăng acid uric máu. Không có báo cáo nào khác về việc dùng men tiêu hóa quá liều.

TRÌNH BÀY: Lọ 60 ml đựng trong hộp giấy.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Cất giữ ở nơi khô, mát, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT

RAPTAKOS, BRETT & CO. LTD.
1st, Pokhran Road, Thane - 400 606, INDIA
Tel.: + 91 - 22 - 4085 8000 - Fax: + 91 - 22 - 4085 8010