

# POLY-TEARS\*

(Dextran 70 0,1%, hypromellose 0,3%)

Dung dịch nhỏ mắt vô trùng

## THÀNH PHẦN

**Hoạt chất:** DUASORB\*, một hệ thống polymer tan trong nước chứa dextran 70 0,1% và hydroxypropyl methylcellulose (hypromellose) 0,3%.

**Chất bảo quản:** POLYQUAD\* (polyquaternium-1) 0,0011%.

**Chất không hoạt tính:** Kali clorid, natri clorid, borax, acid hydrocloric và/hoặc natri hydroxyd để điều chỉnh pH, nước tinh khiết.

## DẠNG BÀO CHẾ

Dung dịch nhỏ mắt vô trùng.

## ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

### Đặc tính dược lực học

Phân nhóm dược trị liệu: các thuốc nhãn khoa khác, nước mắt nhân tạo.

Mã ATC: S01X A20

Dung dịch nhỏ mắt POLY-TEARS\* có chứa dextran 70 và hydroxypropyl methylcellulose (hypromellose), một hệ thống polyme tan trong nước (DUASORB) có thể gắn kết với nước mắt có sẵn ở mắt giúp tăng ướt giác mạc. Thông qua sự kết hợp với các thành phần nước mắt sẵn có để tạo thành một lớp màng trên bề mặt giác mạc, lớp màng này được duy trì thông qua sự bám dính.

Dung dịch nhỏ mắt POLY-TEARS làm tăng độ bền vững của lớp màng nước mắt nhờ pha trộn sinh lý, nhờ vậy giúp cho giác mạc ướt một cách tự nhiên. Thuốc giúp kéo dài thời gian nước mắt lưu lại ở mắt mặc dù độ nhớt của dung dịch thuốc không cao. Thuốc giúp cải thiện độ ướt của giác mạc và độ bền của màng nước mắt, dựa trên bằng chứng từ các nghiên cứu thời gian tan của màng nước mắt.

### Đặc tính dược động học

Có rất ít dữ liệu về sự hấp thu của polyquaternium-1 và hypromellose.

Hypromellose có phân tử lượng lớn (86.000 Dalton) và vì vậy khó hấp thu. Sự hấp thu đường uống của hypromellose đã được chứng minh là rất ít trên chuột. Hypromellose được cho là một chất chuyển hóa rất ít.

Polyquaternium-1 là một hợp chất cao phân tử (4.600-11.000 Dalton) và tỷ trọng lớn, do vậy được dự đoán là không được hấp thu.

## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ đếm giọt DROPTAINER\* chứa 10 ml hoặc 15 ml.

## CHỈ ĐỊNH

Dùng trong các trường hợp sau:

- Hội chứng khô mắt
- Giảm tiết nước mắt
- Sự bất ổn của phim nước mắt

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Chỉ dùng để nhỏ mắt

### Liều lượng

Nhỏ 1 hoặc 2 giọt vào túi kết mạc của mắt cần điều trị, mỗi ngày 5-6 lần.

Không có dữ liệu về sử dụng sản phẩm này ở trẻ em và trẻ vị thành niên, cho bệnh nhân suy gan hay suy thận. Tuy nhiên, căn cứ trên kinh nghiệm sử dụng rộng rãi các chế phẩm nhỏ mắt có chứa thành phần hoạt chất/ tá dược giống như chế phẩm này cho thấy không cần phải hiệu chỉnh liều lượng khi sử dụng dung dịch nhỏ mắt POLY-TEARS cho các đối tượng bệnh nhân nói trên.

### Cách sử dụng

Để tránh tạp nhiễm vào đầu nhỏ thuốc và dung dịch thuốc, cần thận trọng không để đầu nhỏ thuốc chạm vào mí mắt, các vùng lân cận hoặc các bề mặt khác.

Không được sử dụng thuốc này nếu dung dịch bị biến màu hoặc vẫn đục.

Trong trường hợp điều trị đồng thời với các sản phẩm nhỏ mắt khác, cần nhỏ hai thuốc cách nhau 10 đến 15 phút.

### Ba bước để sử dụng dung dịch nhỏ mắt bôi trơn POLY-TEARS:

- 1- Ngửa đầu ra sau.
- 2- Đặt 1 ngón tay dưới mắt, kéo nhẹ mi mắt xuống dưới đến khi mi dưới và nhãn cầu tạo thành túi hình chữ V.
- 3- Nhỏ vào túi hình chữ V đó một hay hai giọt. Tránh không cho đầu ống nhỏ giọt chạm vào mắt.



## CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

## CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Nếu bệnh nhân cần ngừng dùng thuốc và đến khám bác sĩ khi bị đau đầu, đau mắt, thay đổi thị lực, kích ứng mắt, đỏ mắt kéo dài hoặc tình trạng xấu hơn hoặc kéo dài trên 72 giờ.

## TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Mặc dù nghiên cứu về tương tác thuốc chưa được tiến hành, không thấy có tương tác liên quan trên lâm sàng.

## KHẢ NĂNG SINH SẢN, THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ

### Khả năng sinh sản

Chưa biết ảnh hưởng của dung dịch nhỏ mắt POLY-TEARS\* trên khả năng sinh sản của nam giới và nữ giới. Dextran 70 và hypromellose là các thành phần trơ về mặt dược lý và được dự đoán không có ảnh hưởng nào đến khả năng sinh sản.

### Thai kỳ

Do sau khi nhỏ mắt dextran 70 và hypromellose phơi nhiễm toàn thân không đáng kể, thuốc không ảnh hưởng đến thai kì. Hơn nữa, dextran 70 và hypromellose không có tác dụng dược lý. Có thể sử dụng dung dịch nhỏ mắt POLY-TEARS trong thai kỳ.

### Cho con bú

Thuốc không ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bú mẹ do sự phơi nhiễm toàn thân của dextran 70 và hypromellose ở phụ nữ cho con bú là không đáng kể. Ngoài ra, cả hai thành phần hoạt chất đều không có tác dụng dược lý. Có thể sử dụng dung dịch nhỏ mắt POLY-TEARS trong thời gian cho con bú.

## ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Nhin mờ tạm thời hoặc những rối loạn về thị lực có thể ảnh hưởng tới khả năng lái xe và điều khiển máy móc. Nếu bị nhin mờ khi nhỏ mắt, bệnh nhân cần chờ cho tới khi nhìn rõ rồi mới được phép tiếp tục lái xe và vận hành máy móc.

## CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các phản ứng bất lợi sau đây đã được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng với dung dịch nhỏ mắt POLY-TEARS được phân loại theo các quy ước sau: rất phổ biến ( $\geq 1/10$ ), phổ biến ( $\geq 1/100$  đến  $<1/10$ ), không phổ biến ( $\geq 1/1.000$  đến  $<1/100$ ), hiếm ( $\geq 1/10.000$  đến  $<1/1.000$ ) và rất hiếm ( $<1/10.000$ ). Trong mỗi nhóm tần suất, các phản ứng bất lợi được sắp xếp theo thứ tự mức độ nghiêm trọng giảm dần.

Phân loại hệ thống cơ quan	Phản ứng bất lợi
Rối loạn tại mắt	Rất phổ biến: nhin mờ Phổ biến: khô mắt, rối loạn mí mắt, cảm giác bất thường ở mắt, cảm giác có vật lạ trong mắt, khó chịu ở mắt. Không phổ biến: ngứa mắt, kích ứng mắt, sung huyết tại mắt.

Các phản ứng bất lợi khác được xác định từ các giám sát sau khi lưu hành được liệt kê sau đây. Không thể ước tính tần suất từ những dữ liệu có sẵn.

Phân loại hệ thống cơ quan	Phản ứng bất lợi
Rối loạn hệ miễn dịch	Mẫn cảm
Rối loạn hệ thần kinh	Đau đầu
Rối loạn tại mắt	Ban đỏ mí mắt, đau mắt, sưng tấy mắt, ghèn mắt, bờ mi đóng vẩy, tăng tiết nước mắt

**Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Bao gồm cả các tác dụng không mong muốn chưa được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng này.**

## QUÁ LIỀU

Do đặc điểm của chế phẩm này, dự đoán không có độc tính khi nhỏ mắt quá liều hoặc khi nuốt nhầm một lọ thuốc vào đường tiêu hóa.

## ĐỂ XA TẦM TAY VÀ TẦM NHÌN CỦA TRẺ EM

## ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

## NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

## BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 °C. Vứt bỏ lọ thuốc sau khi mở lọ 1 tháng.

## HẠN DÙNG

2 năm kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau khi mở nắp: 1 tháng sau khi mở nắp.

## SẢN XUẤT BỞI

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14, 2870 Puurs - Bỉ.

Dựa trên CCSI TDOC-0012383 1.0, ngày 25/5/2011

POLSOL 0815-1.0/250511