

Macibin

R_x Thuốc bán theo đơn

100 viên nang mềm

Macibin

Acid ursodeoxycholic 300mg



R_x Prescription drug

100 soft capsules

Macibin

Ursodeoxycholic acid 300mg



- Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
Acid ursodeoxycholic.....300 mg
 - Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định & các
thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
 - Bảo quản: Trong hộp kín, tránh ánh sáng,
ở nhiệt độ dưới 30°C
 - Đóng gói: 10 vỉ x 10 viên nang mềm
 - Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, KCN Việt Nam- Singapore, Bình Dương
- SDK:
Số lô SX:
NSX:
HĐ:

WHO-GMP

- Composition: Each soft capsule contains:
Ursodeoxycholic acid.....300 mg
- Indications, administration,
contraindications & other information:
See insert paper.
- Storage: In a hermetic container, protect from
light, below 30°C,
- Package: 10 blisters x 10 soft capsules
Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before use

PHIL PHIL INTER PHARMA
INTER PHARMA



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/8/2014



Rx Thuốc bán theo đơn

Macibin
Acid ursodeoxycholic 300mg



SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

Rx Prescription drug


W4C-GMP

WHO-GMP

Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before use

PHIL
INTER PHARMA





Số lô SX, HD sẽ được dập trên vỉ



MACIBIN

SĐK:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

Acid ursodeoxycholic 300 mg

Tá dược: Dầu đậu nành, Dầu lecithin, Dầu đậu nành hydro hóa một phần, Hard fat, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Ethyl vanillin, Titan dioxide, Màu vàng số 4, Màu vàng số 5, Màu xanh dương số 1, Màu đỏ số 40, Nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang mềm

DUYỆC LỰC HỌC

Acid ursodeoxycholic là một acid mật tự nhiên, hiện diện với lượng nhỏ trong mật người. Acid ursodeoxycholic ức chế gan tổng hợp và bài tiết cholesterol, đồng thời ức chế hấp thu cholesterol ở ruột.

DUYỆC ĐỘNG HỌC

Acid ursodeoxycholic được hấp thu từ đường tiêu hóa và trải qua chu trình gan-ruột. Một phần thuốc được liên hợp tại gan trước khi được tiết vào mật. Nhờ tác dụng của vi khuẩn ở ruột, dạng tự do và dạng liên hợp trải qua quá trình 7 α -dehydroxyl hóa thành acid lithocholic, một phần thuốc được thải trừ trực tiếp qua phân. Phần còn lại được hấp thu, phần lớn được liên hợp hóa và sulphat hóa tại gan trước khi thải trừ vào phân.

CHỈ ĐỊNH

MACIBIN được chỉ định:

- Làm tan sỏi mật giàu cholesterol.
- Điều trị xơ gan mật nguyên phát.
- Dự phòng sỏi mật ở những người giảm cân nhanh.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Tan sỏi mật giàu cholesterol:

Người lớn: Uống 6 – 12 mg/kg/ngày, uống 1 liều duy nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc chia làm 2 – 3 lần, nên tiếp tục uống thuốc 3 – 4 tháng sau khi tan sỏi. Liều có thể được chia không đều nhau, liều lớn hơn uống vào buổi tối trước khi đi ngủ để chống lại nồng độ cholesterol tăng cao lúc sáng sớm. Liều tối đa: 15 mg/kg/ngày.

Xơ gan mật nguyên phát:

Người lớn: Uống 10 – 15 mg/kg/ngày, chia làm 2 – 4 lần.

Dự phòng sỏi mật ở những người giảm cân nhanh:

Người lớn: 300 mg/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bị nghẽn túi mật hoàn toàn.

Bệnh nhân bị viêm gan nặng.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, hoặc phụ nữ có thể mang thai.

Người nhạy cảm với acid mật hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Cần thận trọng khi dùng thuốc ở người bị bệnh tụy tạng nặng, người bị loét dạ dày, người có sỏi ở cơ quan túi mật.



Handwritten signature

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không nên uống acid ursodeoxycholic cùng lúc với than hoạt, colestyramine, colestipol hoặc antacids chứa aluminium hydroxide và/ hoặc smectite (aluminium oxide), vì những chất này gắn kết với acid ursodeoxycholic ở ruột, do đó làm giảm hấp thu và hiệu quả của thuốc. Nếu cần thiết phải dùng những thuốc có chứa các chất nêu trên, phải uống cách ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi uống acid ursodeoxycholic.

Acid ursodeoxycholic có thể làm tăng hấp thu ciclosporin ở ruột. Ở những bệnh nhân đang điều trị ciclosporin, cần theo dõi nồng độ ciclosporin trong máu, điều chỉnh liều nếu cần.

Thuốc ngừa thai uống, hormone oestrogen và các thuốc làm giảm cholesterol máu như clofibrate có thể làm tăng sỏi mật, đối kháng với acid ursodeoxycholic, dùng làm tan sỏi mật.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có dữ liệu an toàn về việc sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thử nghiệm trên động vật cho thấy acid ursodeoxycholic gây quái thai khi dùng ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.

Chưa biết liệu acid ursodeoxycholic có được tiết vào sữa mẹ hay không. Do đó không dùng thuốc này cho phụ nữ đang cho con bú. Nếu cần thiết phải điều trị bằng acid ursodeoxycholic, cần ngừng cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng cho thấy thuốc gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Acid ursodeoxycholic thường được dung nạp tốt.

- Rối loạn tiêu hóa: Có thể gặp buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Hiếm khi đau bụng, táo bón, ợ nóng và khó chịu ở vùng bụng.
- Da: Mày đay, ngứa hiếm khi xảy ra.

*** Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

QUÁ LIỀU

Tiêu chảy có thể xảy ra khi dùng quá liều. Nhìn chung, các triệu chứng quá liều khác thường không xảy ra vì sự hấp thu của Acid ursodeoxycholic giảm đi khi tăng liều dùng và do đó thuốc được thải trừ nhiều hơn qua phân.

Không cần áp dụng biện pháp điều trị quá liều đặc hiệu. Tiêu chảy do quá liều được xử lý bằng điều trị triệu chứng với mục đích cân bằng dịch và điện giải.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng