

MẪU HỘP XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực : 7,5 cm x 8,5 cm x 2,0 cm



Ngày 17 tháng 01 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN NÉN ĐẶT ÂM ĐẠO NYSTATIN 100.000 IU

Kích thước thực : 9,2 cm x 16,0 cm

 THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Nystatin 100.000 I.U

VIÊN NÉN ĐẶT ÂM ĐẠO

CÔNG THỨC: Cho 1 viên:

- Nystatin.....100.000 IU
- Tá dược:vừa đủ 1 viên

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC:
Thuốc kháng nấm : Nystatin có tác dụng kìm hãm hoặc diệt nấm tùy thuộc vào nồng độ và độ nhạy cảm của nấm. Nhạy cảm nhất là các nấm men và có tác dụng rất tốt trên Candida albicans.
Cơ chế tác dụng: Do liên kết với sterol của màng tế bào các nấm nhạy cảm nên nystatin làm thay đổi tính thấm của màng nấm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Tác động trị vi nấm Candida chủ yếu là tại chỗ, không hấp thu qua niêm mạc.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm Candida âm đạo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Quá mẫn cảm với Nystatin.

THẬN TRỌNG:
Nếu có phản ứng quá mẫn, nên ngừng dùng thuốc ngay.
Thận trọng đặt thuốc khi đang mang thai. Chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của thầy thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Bị mất tác dụng kháng Candida albicans nếu dùng đồng thời với riboflavin phosphat.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Trong một vài trường hợp ngoại lệ, có thể gây kích ứng nhẹ ở niêm mạc.
Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Phụ nữ có thai: Không có nguy cơ gì được thông báo.
Phụ nữ cho con bú: Nystatin không bài tiết vào sữa mẹ.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Không ảnh hưởng.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Nén làm ẩm viên thuốc trước khi đặt. Nhúng viên thuốc vào nước đun sôi để nguội khoảng 20 giây.
Đặt sâu trong âm đạo 1 - 2 viên/ngày/sáng và chiều trong 20 ngày liên tiếp. Sau đó đặt 1 viên vào buổi tối trong 4 ngày sau khi thấy hết triệu chứng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 1 vỉ x 12 viên nén đặt âm đạo.

BẢO QUẢN:
Dưới 25°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Viên nén đặt âm đạo NYSTATIN 100.000 IU đặt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO, số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM
F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968
Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 17 tháng 01 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC.



DS. Lê Thanh Sĩ