https://nhathuocngocanh.com/

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN
HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc **QC25/2017/PN-BYT**

Của: **Công ty TNHH MTV Dược Pha Nam Hà Nội**

Địa chỉ: **Số 12H1 Khu Đô Thị Yên Hòa-Phường Yên Hòa-Quận Cầu Giấy-Hà Nội**

Điện thoại**: 043 7833 848**

Đăng ký thông tin thuốc: **Merika Fort**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0233/17/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **01/08/2017**

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2017

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

02-08-2017

https://nhathuocngocanh.com/

M.S.D.N: 0102817520-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHA NAM HÀ NỘI
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

THUỐC BỘT

Men vi sinh sống dạng khô

Merika FORT

THUỐC BỘT

Men vi sinh sống dạng khô

Merika FORT

Men vi sinh sống dạng đông khô *Bacillus subtilis* + *Lactobacillus acidophilus*

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của cục QLD: / QLD-TT. Ngày in tài liệu.../...../.....
Tài liệu gồm 4 trang .Thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang 2 & 3.

THUỐC BỘT

Men vi sinh sống dạng khô

Merika FORT

Men vi sinh sống dạng đông khô Bacillus subtilis
+ Lactobacillus acidophilus

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Mỗi gói 1 g chứa
Bacillus subtilis ..... $2x10^8$ CFU
Lactobacillus acidophilus ..... $2x10^9$ CFU
Tá dược: Icose, amidon vừa đủ 1g

Chỉ định: MERIKA Fort được dùng trong các trường hợp
- Viêm ruột cấp tính hay mãn tính
- Rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy, táo bón
- Tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột bị phá vỡ do kháng sinh, thuốc, stress, nhiễm trùng...

Liều lượng và cách dùng: MERIKA Fort được dùng như sau
- Người lớn và trẻ em : 1 gói x 2-4 lần/ngày
- Trẻ sơ sinh: 1 gói x 1-2 lần/ngày
- Pha trong 1 ít nước đun sôi để nguội hay sữa, nước súp hoặc nước đường để nguội (<40^0C), uống lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn

Chống chỉ định: Không dùng MERIKA Fort khi mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
Thận trọng: Trẻ em dưới 3 tháng tuổi phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không ảnh hưởng
Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có tác dụng không mong muốn nào được báo cáo
"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"
Tương tác thuốc: Sử dụng cùng lúc với thuốc kháng sinh tetracycline có thể làm giảm tác dụng của tetracycline
Quá liều và cách xử trí: Không có dấu hiệu quá liều được biết ở người. Trong trường hợp quá liều, điều trị triệu chứng và hỗ trợ
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30^0C
Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở

Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất
Qui cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1g

TRÁNH XA TẦM VỚI CỦA TRẺ
"ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ"

Sản xuất tại
DAVAC ISO 9001:2008 GMP - WHO
CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT
18 Lê Hồng Phong, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
ĐT: (063) 383 66 13

Phân phối bởi: Công Ty TNHH MTV Dược Pha Nam Hà Nội
Số 12H1 Khu Đô Thị Yên Hòa - P. Yên Hòa - Q.Cầu Giấy - TP Hà Nội