

STERILOCK Sterilised Water for Injections B.P. PYROGEN FREE	STERILOCK Sterilised Water for Injections B.P. PYROGEN FREE
50 x 10 ml	50 x 10 ml

STERILOCK

Sterilised Water for Injections B.P.

PYROGEN FREE

STERILOCK

Sterilised Water for Injections B.P.

PYROGEN FREE

M.L.: G/1080
Batch No.:

Mfg. Date : dd/mm/yy
Exp. Date : dd/mm/yy

Nhãn phụ 100% Actual Size

STERILISED WATER FOR INJECTION BP
(Nước pha tiêm BP)

Mỗi ống chứa: Nước pha tiêm BP 10 ml

Dạng bào chế: dung môi pha tiêm

Đường dùng: tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch/ tiêm dưới da theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Đóng gói: Hộp 50 ống- SĐK:

Chi định, Cách dùng, Chống chỉ định và các thông tin khác: xin đọc hướng dẫn sử dụng kèm theo

Số lô SX, NSX, HD xem "Batch No.", "Mfg. Date", "Exp. Date" trên bao bì

Bảo quản dưới 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất bởi: Marck Biosciences Ltd - 876, N.H. No.8, Vill. Hariyala, Tal. Matar, Dist. Kheda - 387411, Gujarat, Ấn Độ

DNNK

Nhãn phụ 100% Actual Size

STERILISED WATER FOR INJECTION BP
(Nước pha tiêm BP)

Mỗi ống chứa: Nước pha tiêm BP 10 ml

Dạng bào chế: dung môi pha tiêm

Đường dùng: tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch/ tiêm dưới da theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Đóng gói: Hộp 50 ống- SĐK:

Chi định, Cách dùng, Chống chỉ định và các thông tin khác: xin đọc hướng dẫn sử dụng kèm theo

Số lô SX, NSX, HD xem "Batch No.", "Mfg. Date", "Exp. Date" trên bao bì

Bảo quản dưới 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất bởi: Marck Biosciences Ltd - 876, N.H. No.8, Vill. Hariyala, Tal. Matar, Dist. Kheda - 387411, Gujarat, Ấn Độ

DNNK

g/886

STERILISED WATER FOR INJECTION BP

(Nước vô khuẩn pha tiêm BP)

THÀNH PHẦN

Mỗi ống chứa: Nước pha tiêm BP 10 ml

DẠNG BÀO CHÉ: Dung môi pha tiêm

CHỈ ĐỊNH

Nước pha tiêm này được chỉ định dùng hoà tan hoặc pha loãng các thuốc dùng tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp hoặc tiêm dưới da theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Đường dùng: Chỉ dùng pha tiêm.

Liều dùng: Liều dùng được chỉ định theo đặc tính của thuốc được pha tiêm. Tần số sử dụng phụ thuộc vào liều dùng của thuốc cần pha tiêm.

Sau khi thuốc đã pha, liều dùng phụ thuộc vào độ tuổi, trọng lượng và điều kiện lâm sàng của bệnh nhân cũng như các xét nghiệm lâm sàng.

Cách dùng: Dung môi dùng pha loãng và tiêm truyền như các chất phụ trợ trong điều trị bệnh. Các hướng dẫn sử dụng liên quan tới các thuốc kết hợp được chỉ định về thể tích cũng như đường dùng phù hợp

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Nước pha tiêm không được dùng riêng.

Chống chỉ định liên quan tới thuốc được hòa tan

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO

Chỉ được dùng khi nước trong suốt và ống còn nguyên vẹn.

Nước pha tiêm nhược trung và không được dùng riêng

Trước khi hoà tan hoặc pha loãng bất kỳ chất nào, đảm bảo rằng nước pha tiêm là dung môi hoặc chất pha loãng được chỉ định bởi hướng dẫn sử dụng của thuốc cần dùng đó.

Đảm bảo rằng dung dịch tạo thành đồng trương với máu trước khi dùng tiêm tĩnh mạch.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

• Phụ nữ có thai

Nước pha tiêm đã được dùng rộng rãi cho phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mà không thấy có sự tăng về tần số dị tật hoặc các tác dụng có hại trực tiếp hoặc gián tiếp lên bào thai. Cần đọc kỹ Thông tin sản phẩm của thuốc được hòa tan hoặc pha loãng để đảm bảo thuốc đó an toàn khi dùng trong thai kỳ

- **Phụ nữ cho con bú**

Có thể dùng nước pha tiêm cho các bà mẹ đang cho con bú. Cần đọc Thông tin sản phẩm của thuốc được hòa tan hoặc pha loãng để đảm bảo rằng thuốc đó an toàn khi dùng cho các bà mẹ đang cho con bú

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Nước pha tiêm không có tác dụng được lý và chỉ được dùng làm dung môi

Các phản ứng có thể xảy ra do dung môi, các thuốc được hòa tan, kỹ thuật pha tiêm hoặc cách dùng gồm: sốt, tổn thương tại chỗ, áp xe, hoại tử mô hoặc nhiễm khuẩn tại vị trí tiêm, tắc động - tĩnh mạch hoặc sưng tĩnh mạch từ vị trí tiêm và chảy máu.

Nếu xảy ra 1 tác dụng không mong muốn phải ngừng tiêm, đánh giá bệnh nhân, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp, nếu có thể, bảo quản dung môi còn dư để tiến hành kiểm tra.

Thông báo cho Bác Sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

QUÁ LIỀU

Không xảy ra quá liều khi pha với thể tích nhỏ. Nếu vô tình tiêm một lượng nước pha tiêm lớn mà trước tiên không đảm bảo được tính đáng trưng, các tác dụng gây giảm trương lực có thể xảy ra gồm: tổn thương tế bào tại chỗ hoặc mất máu. Những bất thường về chất điện phân có thể xảy ra. Cần phải giám sát bệnh nhân và điều trị phù hợp

BẢO QUẢN

Bảo quản dưới 30°C

ĐÓNG GÓI:

Vì 5 ống nhựa Polyethylene dính liền nhau, vì có thể bẻ gập lại để tách rời từng ống. Mỗi ống chứa 10 ml nước pha tiêm. 10 vỉ như vậy đóng trong 1 hộp carton và 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

HẠN DÙNG

48 tháng kể từ ngày sản xuất

Không sử dụng thuốc quá hạn dùng in trên nhãn hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất bởi:

MARCK BIOSCIENCES LIMITED

876, NH no.8, Vill. Hariyala, Tal. Matar, Dist. Kheda - 387 411, Gujarat, Ấn Độ



Nguyễn Việt Hùng