https://nhathuocngocanh.com/

Nhãn vỉ: 10 viên

Nhãn hộp (10 vỉ x 10 viên nang)

Ngày 20 tháng 5 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. Phùng Minh Dũng

https://nhathuocngocanh.com/

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LUSANTI

Thành phần: mỗi viên có chứa

Glucosamin. HCl 250mg

Tá dược: Comprecel 101, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Dược lực học:

- Glucosamin tham gia quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là một Amino-monosaccharide, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là muco-polysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Glucosamin còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương.
- Do glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp, tăng khả năng đệm chống va đập của sụn khớp. Vì thế glucosamin không những giảm triệu chứng của thoái khớp (đau, khi vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển. Glucosamin có trong mọi mô của cơ thể con người, trong tự nhiên Glucosamin được ly trích từ vỏ tôm, cua.

Dược động học: chưa có thông tin.

Chỉ định:

- Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

Liều lượng và cách dùng:

Uống trong bữa hoặc ngay sau ăn, liều dùng trung bình:

- Người trên 18 tuổi: 2 viên x 3 lần/ngày.
- Thời gian dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ, thông thường dùng liên tục 2-3 tháng.

Chống chỉ định:

- Người có thai và đang cho con bú.
- Trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Thận trọng:

- Không dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

Tác dụng không mong muốn:

- Thường là nhẹ và không thường xuyên, bao gồm đau bụng, táo bón, tiêu chảy, nhức đầu và phát ban.

Thời kì có thai và đang cho con bú:

- Thời kì mang thai và cho con bú: không dùng vì chưa có báo cáo về độ an toàn và hiệu quả điều trị của thuốc.

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.

Quá liều và xử trí:

- Dùng thuốc quá liều hoặc dài ngày có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.
- Xử trí: Ngừng thuốc và hỏi ý kiến của bác sỹ.

Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.

Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn.

Bảo quản:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30^{0}C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

---

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

358 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

ĐT: 04-38643368 Fax: 04-39641584

Sản xuất tại: Nhà máy Dược phẩm số 2

Trung Hậu - Tiền Phong- Mê Linh - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. Phùng Minh Dũng