

84/142

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8/11/2018



MEZAFEN

Loxoprofen natri 60mg



Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

GMP - WHO

Thành phần/ Compositions:

Mỗi viên nén chứa/ Each tablet contains:

Loxoprofen natri hydrat tương ứng với/
equivalent to Loxoprofen natri 60mg

Tá dược vđ/ Excipients q.s.f 1 viên/ 1 tablet

Tiêu chuẩn/Specifications: TCCS/ Manufacturer's.

Bảo quản/ Storage:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/

Store in a dry place, below 30°C.

SDK (Reg.No):



MEZAFEN



MEZAFEN

MEZAFEN

Loxoprofen sodium 60mg



Box of 3 blisters of 10 tablets

GMP - WHO

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng/ Indications,

Cotraindications, Dosage - Administration:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp/ See the
package insert inside.

Độc xa tầm tay của trẻ em/ Keep out of reach of children.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/ Carefully read
the accompanying instructions before use.

Sản xuất tại/ Manufactured by:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C

La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội/ La Khe - Ha Dong - Hanoi City

Số lô SX (Lot.No) :

Ngày SX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date) :

Hướng dẫn sử dụng thuốc
MEZAFEN

- **Dạng thuốc:** Viên nén.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ x 10 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- **Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên) thành phẩm:** Mỗi viên nén chứa:
Loxoprofen natri hydrat tương ứng với Loxoprofen natri 60mg
Tá dược vđ 1 viên
(Tá dược gồm: Microcrystallin cellulose, Natri starch glycolat, Povidon (PVP), magnesi stearat, Crospovidon ethanol 96).
- **Chỉ định:** Kháng viêm và giảm đau trong: Viêm khớp dạng thấp mạn tính, viêm khớp xương, đau thắt lưng, viêm quanh khớp vai, hội chứng cổ - vai - cánh tay, sau phẫu thuật, chấn thương, nhô răng.
Hạ sốt, giảm đau trong viêm đường hô hấp trên cấp.
- **Cách dùng và liều dùng:** Uống sau ăn
- Người lớn: 1 viên x 3 lần/ngày, nếu dùng liều đơn: 1 - 2 viên x 1 lần/ngày.
- Hạ sốt giảm đau trong viêm đường hô hấp trên: người lớn: 1 viên x 2 - 3 lần/ngày.
- **Chống chỉ định:** Quá mẫn cảm với loxoprofen, hen do aspirin hoặc tiền sử có bị hen. Loét dạ dày, rối loạn huyết học nặng, suy gan nặng, suy thận nặng.
- **Thận trọng:** Phụ nữ có thai (nhất là giai đoạn cuối), cho con bú.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, cân nhắc lợi ích khi dùng thuốc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Kích ứng dạ dày.
- * **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Thuốc chống đông nhóm coumarin, sulfamide hạ đường huyết
- **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.** Khi thuốc có biểu hiện biến màu, viên ẩm, vỡ rách, mờ nhãn... hoặc có biểu hiện nghi ngờ khác phải hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS 034-B-110-12

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

**"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"**

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội
ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc


PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Bá Lai