

Rx **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Thuốc này chỉ bán theo đơn của Bác sỹ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hỏi Bác sỹ hoặc Dược sỹ để biết thêm thông tin chi tiết

MOCERIN-25

(Diacerein)

Viên nang 25 mg

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang có chứa:

Hoạt chất:

Diacerein 25 mg

Tá dược: Tinh bột ngô, Lactose, Talc tinh khiết, Croscarmellose Natri, Colloidal Anhydrous Silica.

DẠNG BÀO CHẾ:

Viên nang gelatin cứng

ĐÓNG GÓI: Mỗi vỉ Nhôm/ nhôm chứa 10 viên, 05 vỉ như vậy được đóng trong một hộp carton và một tờ hướng dẫn sử dụng.

DƯỢC LỰC HỌC:

Diacerein là thuốc chống viêm xương khớp có tác dụng chống viêm để điều trị các bệnh thoái hóa khớp (viêm xương khớp và các bệnh có liên quan), được dung nạp tốt ở dạ dày vì thuốc không ức chế tổng hợp prostaglandin.

Rhein, một chất chuyển hóa có hoạt tính của Diacerein là một anthraquinone được tìm thấy trong một cây thuộc họ Cassia, có tác dụng chống viêm vừa phải và tác dụng giảm đau, nhuận tràng nhẹ.

Kết quả của một số nghiên cứu in-vitro và in-vivo cho thấy Diacerein và Rhein, ức chế sự sản xuất và hoạt động của IL-1, chất này đóng vai trò cơ bản trong bệnh viêm khớp và thoái hóa sụn. Do ức chế IL-1 nên Diacerein làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Diacerein cũng ức chế

tác dụng thúc đẩy các men phá huỷ sụn của IL-1.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Sau khi uống Diacerein được chuyển hoá hoàn toàn thành rhein, chất chuyển hoá có hoạt tính, trước khi vào tới vòng tuần hoàn. Khả dụng biểu kiến của rhein khoảng 35%. Rhein được thải trừ qua đường thận (20%) dưới dạng chất cộng hợp tại gan với acid glucuronic (60%) và rhein sulfate (20%). Thể tích phân bố: 13,2 L. độ thanh thải trong huyết tương : 1,6 L/giờ, độ thanh thải ở thận: 0,13 L/giờ, nửa đời thải trừ giai đoạn cuối: 4,3 giờ

Ở những bệnh nhân có mức suy thận vừa phải hoặc nặng được động học bị thay đổi, do vậy, cần giảm liều diacerein xuống còn một nửa đối với những bệnh nhân suy thận nặng.

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc được chỉ định điều trị các bệnh viêm xương khớp, viêm khớp mạn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Chống chỉ định Diacerein cho những bệnh nhân mẫn cảm với Diacerein hoặc với các dẫn xuất của anthraquinone hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 15 tuổi vì độ an toàn và tác dụng của thuốc với nhóm tuổi này chưa được xác định

Phụ nữ có thai, các bà mẹ đang cho con bú.

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:

Nên cân nhắc lợi ích so với nguy cơ của việc dùng Diacerein cho những bệnh nhân có rối loạn đường ruột trước đó, đặc biệt là đại tràng dễ bị kích thích.

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân suy thận. Giảm liều còn một nửa đối

với những bệnh nhân suy thận nặng.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai: Phân loại B.

Các nghiên cứu trên súc vật không thấy ảnh hưởng gì đối với sự sinh sản, tuy nhiên chưa có đủ những nghiên cứu có kiểm soát trên người, không nên dùng cho phụ nữ có thai

Dùng cho các bà mẹ đang cho con bú:

Một số nghiên cứu cho thấy diacerein có qua sữa người. Các bà mẹ đang cho con bú không nên dùng thuốc

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

Không ảnh hưởng tới khả năng này.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không dùng đồng thời với các thuốc nhuận tràng vì có thể làm tăng tác dụng nhuận tràng

Nên tránh dùng đồng thời với các thuốc chứa muối, oxide hoặc hydroxide nhôm, calci và magie vì chúng làm giảm hấp thu Diacerein. Cần dùng những thuốc này sau khi uống Diacerein 2 giờ

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các tác dụng không mong muốn khi dùng Diacerein là đau dạ dày, ợ nóng, tiêu chảy, phân mềm và thường xuyên đi ngoài. Trong đó, tiêu chảy là tác dụng không mong phổ biến nhất và thường xảy ra trong 2 tuần đầu điều trị với diacerein.

“Báo cho bác sỹ trong trường hợp có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào liên quan tới việc sử dụng thuốc”

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:

Mỗi lần 2 viên Mocerin-25 x 2 lần/ngày trong thời gian điều trị.

Tuy nhiên, vì Diacerein có khởi phát hiệu

quả chậm và tác dụng đạt được sau 2-4 tuần điều trị, bệnh nhân không nên ngưng điều trị trước khi hiệu quả của thuốc được thấy rõ ràng.

Do tác động khởi đầu chậm, và khả năng dung nạp rất tốt qua đường tiêu hóa nên Diacerein có thể kết hợp với một thuốc kháng viêm không steroid hoặc thuốc giảm đau trong 2-4 tuần điều trị đầu tiên.

QUÁ LIỀU:

Dùng liều cao Diacerein do uống nhầm hoặc cố ý có thể gây tiêu chảy. Cần điều trị triệu chứng. Nếu tiêu chảy kéo dài, xin đến gặp bác sỹ của bạn. Điều trị cấp cứu bao gồm phục hồi cân bằng nước – điện giải nếu cần thiết.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn cho phép

BẢO QUẢN : Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẦM TAY TRÉ EM

SDK: VN-12038 -11



Tên & địa chỉ nhà sản xuất:

SYNMEDIC LABORATORIES

Địa chỉ: 106 - 107, HSIDC Indl. Estate, Sec-31, Faridabad - 121 003 (Haryana), INDIA.

Điện thoại: 91-129-2250627

Fax: 91-129-4104047