https://nhathuocngocanh.com/

Biosubtyl-II

Gói 1 gam

*** Men vi sinh sống ***

THÀNH PHẦN: Trong mỗi gói có chứa:

* *Bacillus subtilis*.....10^7 - 10^8 CFU
* Tá dược (Lactose, Amidon, Hương Dâu).....vừa đủ 1 gam

DẠNG BÀO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Thuốc bột - Gói 1 gam, Hộp 25 gói.

DƯỢC LỰC HỌC:

Bacillus subtilis là loại vi khuẩn có sức sống cao, có khả năng đối kháng với các loại vi sinh vật khác để phục hồi thế cân bằng sinh thái của hệ vi khuẩn đường ruột. Tác dụng của thuốc trên cơ sở những đặc tính của chủng vi khuẩn này:

- *Bacillus subtilis* có khả năng sản sinh nhiều enzym, nhưng quan trọng nhất là amylase và protease là 2 enzym thuộc hệ thống tiêu hóa.
- *Bacillus subtilis* có khả năng sinh tổng hợp một số chất kháng sinh có tác dụng ức chế sinh trưởng hoặc tiêu diệt một số vi sinh vật khác, tác dụng lên cả vi khuẩn Gram (-), Gram (+) và nấm gây bệnh.
- *Bacillus subtilis* tồn tại trong sản phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị acid cũng như các enzym tiêu hóa ở dịch vị phá hủy. Ở ruột, bào tử nảy mầm và phát triển thành thể hoạt động giúp cân bằng hệ vi sinh có ích trong đường ruột, cải thiện hệ thống tiêu hóa, nhất là sau khi sử dụng kháng sinh kéo dài.

Biosubtyl-II là sinh phẩm không có tác dụng phụ, không có bất kỳ tác hại nào cho sức khỏe khi sử dụng thường xuyên. Đặc biệt, tá dược là đường đơn nên dễ hấp thụ, có tác dụng bổ trợ cho trực khuẩn *B.subtilis* phát triển mạnh và tạo hương vị thơm ngọt, dễ uống.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị tiêu chảy, viêm ruột cấp và mạn tính.
- Rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân sống.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn : 2 - 4 gói/ ngày.
- Trẻ em : 1 - 2 gói/ ngày.

Uống với nước đun sôi để nguội (Không hòa tan thuốc với nước nóng)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thuốc ở dạng bổ sung vi khuẩn nên không có lưu ý và cảnh báo đặc biệt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: Không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không có.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Cho đến nay chưa ghi nhận có tác dụng phụ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.

Nếu dùng thuốc quá liều khuyến cáo, bỏ qua liều tiếp theo, sau đó tiếp tục liệu trình như thông thường.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất:

BIOPHARCO

GMP-WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 058.3828134 - Fax: 058.3828135

Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
ĐT: 058.3744263 - Fax: 058.3744265

Email: biopharco@dng.vnn.vn Website: www.biopharco2.com.vn