

# TIÊU CHẨN ?

**VIÊM RUỘT CẤP TÍNH VÀ MẠN TÍNH Ở NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM ?**

## RÔI LOẠN TIÊU HÓA SAU KHI DÙNG KHÁNG SINH ?

Đã cá

# SUBTYL



08/05/2018



CÔNG THỨC: Bột chia vi khuẩn *Bacillus subtilis* trong đường vi khuẩn *Bacillus subtilis* sống  $10^6$  -  $10^7$  cfu. Tá được vita dù 1 viên (gói). CHỈ ĐỊNH: Tiêu chảy, viêm ruột cấp và mạn tính ở người lớn và trẻ em. Ngừa và trị các rối loạn tiêu hóa sau khi dùng kháng sinh. CÁCH DÙNG: Uống ngày 2 lần, trước khi ăn và cách xa liều dùng kháng sinh. Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 3 - 4 viên (gói)/ngày. Trẻ em ≥ 1 tuổi: 1 - 2 viên (gói)/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chưa có báo cáo về chống chỉ định. THAM TRỌNG: Không nên trộn thuốc vào các dung dịch hoặc thực phẩm quá nóng (trên 50°C) hay quá lạnh (nuôi đá) vì SUBTYL có chứa các vi khuẩn sống. Không được pha thuốc vào thức uống có chìa còn. Tránh giữ thuốc nơi ẩm và nóng. THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ: Có thể sử dụng thuốc đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo về tác dụng phụ khi sử dụng SUBTYL. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sĩ hoặc được sỹ về những thuốc đang sử dụng. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhận viện y tế có phương pháp xử lý. ĐỐC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: XXXXXXQLD-TT, ngày... tháng... năm...;

Ngoài... tháng... năm... in tài liệu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR** - 29/7 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP Hồ Chí Minh - Việt Nam  
ĐT: 84-8-38650258 - 84-8-38650436 - Fax: 84-8-38650394 - Email: info@mekophar.com - Website: www.mekophar.com

TR. HỒM, ngày 26 tháng 04 năm 2013

GIAO ĐỘC GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

HÓA-DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

ĐS. Nguyễn Thùy Văn

# SUBTYL

Viên nang

## CÔNG THỨC:

Bột chứa vi khuẩn *Bacillus subtilis* tương đương vi khuẩn *Bacillus subtilis* sống  $10^6 - 10^7$  cfu  
Tá dược vừa đủ..... 1 viên  
(Magnesium stearate, Glucose monohydrate).

## TÍNH CHẤT:

SUBTYL chứa vi khuẩn *Bacillus subtilis* sống, hoạt động mạnh ở  $37^\circ\text{C}$  trong môi trường ruột non của cơ thể, rất thích hợp để điều trị những bệnh nhiễm khuẩn đường ruột, tiêu chảy, viêm ruột cấp và mạn tính ở người lớn và trẻ em dựa trên những đặc tính của chủng vi khuẩn này:

- *Bacillus subtilis* có khả năng sản sinh nhiều enzyme, nhưng quan trọng nhất là amylase và protease, 2 loại enzyme thuộc hệ thống men tiêu hóa.

- *Bacillus subtilis* có khả năng sinh tổng hợp một số chất kháng sinh có tác dụng ức chế sinh trưởng hoặc tiêu diệt một số vi sinh vật khác, tác dụng lên cả vi khuẩn Gram(-), Gram(+) và nấm gây bệnh.

- *Bacillus subtilis* tồn tại trong sản phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị acid cũng như các men tiêu hóa ở dịch vị phá hủy. Ở ruột, bào tử này mầm và phát triển thành thể hoạt động giúp cân bằng hệ vi sinh có ích trong đường ruột, cải thiện hệ thống tiêu hóa, nhất là sau khi sử dụng kháng sinh kéo dài.

## CHỈ ĐỊNH:

- Tiêu chảy, viêm ruột cấp và mạn tính ở người lớn và trẻ em.
- Ngừa và trị các rối loạn tiêu hóa sau khi dùng kháng sinh.

## CÁCH DÙNG:

- Uống ngày 2 lần, trước khi ăn và cách xa liều dùng kháng sinh.
- Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 3 - 4 viên/ngày.
- Trẻ em ≥ 1 tuổi - 12 tuổi: 2 - 3 viên/ngày.
- Trẻ em < 1 tuổi: 1 viên/ngày.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Chưa có báo cáo về chống chỉ định.

## THẬN TRỌNG:

- Không nên trộn thuốc vào các dung dịch hoặc thực phẩm quá nóng (trên  $50^\circ\text{C}$ ) hay quá lạnh (nước đá) vì SUBTYL có chứa các vi khuẩn sống.

- Không được pha thuốc vào thức uống có chứa cồn.
- Tránh giữ thuốc nơi ẩm và nóng.

## THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

Có thể sử dụng thuốc đối với phụ nữ mang thai và cho con bú.

## TÁC DỤNG PHỤ:

- Chưa có báo cáo về tác dụng phụ khi sử dụng SUBTYL.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## TƯƠNG TÁC THUỐC:

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sĩ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

## QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

## HẠN DÙNG:

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

## BẢO QUẢN:

Nơi khô (độ ẩm ≤ 70%), nhiệt độ ≤  $30^\circ\text{C}$ , tránh ánh sáng.

## TRÌNH BÀY:

- Vi 10 viên nang. Hộp 2 vi.
- Lọ 20 viên nang. Hộp 1 lọ.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam