

NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN CHAI

(40 viên/ chai)



CÔNG THỨC: Cho 01 viên: Cao khô **TRINH NỮ CRILA** 250mg, tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần. Tá dược: Tinh bột, Aerosil, Natri starch glycolate, Talc, Magnesi stearate ...v.v. 1 viên.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Giảm các triệu chứng của bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt (đi tiểu khó, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm). Điều trị u xơ tử cung.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong thành phần của thuốc.

CÁCH DÙNG: • Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 8 tuần, nếu cần lại dùng tiếp đợt khác. • Điều trị u xơ tử cung: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 5 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 9 tuần, nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

GMP-WHO

Chai 40 viên nang cứng

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH THIÊN DƯỢC

Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Tel: 0650.3653073 - 08.82647547
Website: thienduoc.com

Tư vấn sản phẩm miễn cước: 18006045
Sản xuất theo TCCS, Số ĐK:
Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng
Bảo quản nhiệt độ dưới 30°C
Đã xé tam giác trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Số lô :

Ngày SX :

Hạn dùng :

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT


Lần đầu: 19 / 9 / 17

✓

NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN VỈ MẶT ALU



HƯỚNG NHÓM CHẠY



Khô 135 mm

✓

NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN VỈ MẶT PVC



Số lô:	Hạn dùng:	Số lô:	Hạn dùng:

Khô 135 mm

✓

TÚI NHÔM



22

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KT: 120 x 170 mm



Viên nang cứng

CRILA®

GMP-WHO

Công thức: Cho 1 viên: Cao khô Trinh nữ Crila (*Crinum latifolium* L.) 250mg, tương đương 1.25 mg alcaloid toàn phần. Tá dược: Tinh bột, Aerosil, Natri starch glycolate, Talc, Magnesi stearate...vđ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Chỉ định:

- **Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt.** Giảm các triệu chứng của bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt (đi tiểu khó, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm).
- **Điều trị u xơ tử cung.**

Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong thành phần của thuốc.

Liều dùng:

- **Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt:** Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 8 tuần. Nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.
- **Điều trị u xơ tử cung:** Ngày uống 2 lần, mỗi lần 5 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 9 tuần. Nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.

(Không dùng thuốc quá hạn dùng hoặc nghi ngờ về chất lượng)

Đóng gói: Hộp 04 chai x 40 viên nang cứng.

Hộp 05 túi nhôm x 02 vỉ x 10 viên nang cứng.

Tác dụng không mong muốn: Có thể chóng mặt nhẹ, đầy bụng, song rất hiếm và sẽ tự hết sau 1, 2 ngày điều trị.

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em: Chưa nên dùng thuốc này vì chưa có nghiên cứu lâm sàng đối với nhóm bệnh nhân này. Nếu cần thiết phải sử dụng xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Quá liều và xử trí: Trường hợp quá liều nên ngừng thuốc, điều trị triệu chứng và các biện pháp hỗ trợ.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi Bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất theo Tiêu chuẩn cơ sở



Thiên Dược Co., Ltd

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH THIÊN DƯỢC
Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên
Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Tel: 0650.3653073 - 04.62963787 - 08.62647547
Website: thienduoc.com
Tư vấn sản phẩm miễn cước: 18006045



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lô Minh Hùng

✓