

MẪU NHÃN

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

a). Nhãn vỉ 10 viên nén.

SỐ LÔ SX:	HD:
DOGARLIC® Cao tỏi 5/1 300 mg Cao nghệ 4/1 25 mg	DOGARLIC® <i>Allium sativum</i> extract <i>Curcuma longa</i> extract
DOGARLIC® <i>Allium sativum</i> extract <i>Curcuma longa</i> extract	DOGARLIC® Cao tỏi 5/1 300 mg Cao nghệ 4/1 25 mg
DOGARLIC® Cao tỏi 5/1 300 mg Cao nghệ 4/1 25 mg	DOGARLIC® <i>Allium sativum</i> extract <i>Curcuma longa</i> extract
DOGARLIC® <i>Allium sativum</i> extract <i>Curcuma longa</i> extract	DOGARLIC® Cao tỏi 5/1 300 mg Cao nghệ 4/1 25 mg
DOGARLIC® Cao tỏi 5/1 300 mg Cao nghệ 4/1 25 mg	 DOMESCO CTCP XNK Y TẾ DOMESCO

b). Nhãn chai 50 viên nén.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa: - Cao tỏi 5/1 (<i>Allium sativum</i> extract) 300 mg (tương đương 1500 mg tỏi tươi) - Cao nghệ 4/1 (<i>Curcuma longa</i> extract) 25 mg (tương đương 100 mg nghệ tươi) - Tá dược vừa đủ CHỈ ĐỊNH: Hạ cholesterol máu, điều hòa triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc, phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không dùng. SBK: TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS	DOGARLIC® 50 VIÊN NÉN GMP - WHO  DOMESCO CHUYÊN SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp (Đạt chứng nhận ISO 9001 - 2008 & ISO/IEC 17025)	TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian đông máu. TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc có thể gây viêm da, dị ứng, ợ nóng, tiêu chảy. CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống từ 2 - 4 viên/ngày, chia 2 lần, trước bữa ăn hoặc tùy theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. BẢO QUẢN: Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Ngày SX-Số lô SX-HD: 34 x 135
---	--	---

c). Nhãn chai 100 viên nén.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa: - Cao tỏi 5/1 (<i>Allium sativum</i> extract) 300 mg (tương đương 1500 mg tỏi tươi) - Cao nghệ 4/1 (<i>Curcuma longa</i> extract) 25 mg (tương đương 100 mg nghệ tươi) - Tá dược vừa đủ CHỈ ĐỊNH: Hạ cholesterol máu, điều hòa triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc, phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không dùng. SBK: TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS	GMP - WHO DOGARLIC® 100 VIÊN NÉN  DOMESCO CHUYÊN SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp (Đạt chứng nhận ISO 9001 - 2008 & ISO/IEC 17025)	TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian đông máu. TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc có thể gây viêm da, dị ứng, ợ nóng, tiêu chảy. CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống từ 2 - 4 viên/ngày, chia 2 lần, trước bữa ăn hoặc tùy theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. BẢO QUẢN: Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Ngày SX-Số lô SX-HD: 53 x 147
---	---	---



2. Nhãn trung gian:

a) Nhãn hộp 2 vỉ x 10 viên nén.

GMP - WHO 2 VỈ X 10 VIÊN NÉN



DOGARLIC®



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp
(Đạt chứng nhận ISO 9001 : 2008 & ISO/IEC 17025)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:
- Cao tỏi 5/1 (*Allium sativum* extract) 300 mg
(tương đương 1500 mg tỏi tươi)
- Cao nghệ 4/1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg
(tương đương 100 mg nghệ tươi)
- Tá dược vừa đủ

BẢO QUẢN: Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

SĐK : **TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

GMP - WHO 2 BLISTERS X 10 TABLETS



DOGARLIC®



DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.
66 National road 30 - Cao Lanh City - Dong Thap Province
(Achieved ISO 9001: 2008 & ISO/IEC 17025 certification)

Ngày SX - Số Lô SX - HJ
Mg Date - Lot No - Exp Date

COMPOSITION : Each tablet contains
- Garlic extract 5/1 (*Allium sativum* extract) 300 mg
(equivalent to 1500 mg fresh Garlic)
- Turmeric extract 4/1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg
(equivalent to 100 mg fresh Turmeric)
- Excipients s q f

STORAGE: Below 30°C, protect from direct light.

INDICATIONS, DOSAGE AND METHOD OF ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read the package insert.

REGISTRATION NUMBER: **MANUFACTURER'S SPECIFICATION**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE




b). Nhân hộp 1 chai x 100 viên nén.



DOMESCO

DOGARLIC®

GMP - WHO
100 TABLETS



DOMESCO MEDICAL IMPORT CO., LTD. (SĐKK K.D. 1400460395 - C.T.C.P.)
66 National road 30 - Cao Lãnh City - Đồng Tháp Province
(Achieved ISO 9001 : 2008 & ISO IEC 17025 verification)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:
- Cao tỏi 5:1 (*Allium sativum* extract) 300 mg
(tương đương 1500 mg tỏi tươi)
- Cao nghệ 4:1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg
(tương đương 100 mg nghệ tươi)
- Tá dược và đủ

CHỈ ĐỊNH: Hạ cholesterol máu điều hòa triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không dùng

TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian đông máu

TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc có thể gây viêm dạ, đi ếng, ợ nóng, tiêu chảy.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống từ 2 - 4 viên/ngày, chia 2 lần, trước bữa ăn hoặc tùy theo sự chỉ dẫn của bác sĩ


BẢO QUẢN: Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

SBK:
TIÊU CHUẨN AP DÙNG: TCCS
DỄ XÀ TẮM TAY CỦA TRẺ EM
BƯỚC Kử HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

Handwritten signature

DOGARLIC®

GMP - WHO
100 VIÊN NÉN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp
(Đạt chứng nhận ISO 9001 : 2008 & ISO IEC 17025)

COMPOSITION : Each tablet contains
- Garlic extract 5:1 (*Allium sativum* extract) 300 mg
(equivalent to 1500 mg fresh Garlic)
- Turmeric extract 4:1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg
(equivalent to 100 mg fresh Turmeric)
- Excipients s, q, f

INDICATIONS: Regulates blood pressure, triglyceridemia, cholesteraemia. Helps as a prophylactic against atherosclerosis.

CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity to components the drugs. Pregnant women, women after the birth do not have congestion do not use Dogarlic.

DRUG INTERACTIONS: Concomitant use of warfarin can increase coagulation time.

SIDE EFFECTS: The drugs can cause dermatitis, allergy, heartburn, diarrhea.


DOSAGE AND ADMINISTRATION: 2 - 4 tablets daily, twice per day before a meal or conform to prescription of your doctor.

STORAGE: Below 30°C, protect from direct light.

REGISTRATION NUMBER :
MANUFACTURER'S SPECIFICATION
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

Ngày SX-Số 10 SX-HD
Mũi dẹt-lat type-Ero date





**GMP - WHO
50 TABLETS**

DOGARLIC®



DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JSC - HATCH CO., LTD.
66 National Road 30 - Binh Lap Commune - Binh Thuan Province
(Achieved ISO 9001 - 2008 & ISO 13485 certification)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:
- Cao tỏi 5/1 (*Allium sativum* extract) 300 mg
(tương đương 1500 mg tỏi tươi)
- Cao nghệ 4/1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg
(tương đương 100 mg nghệ tươi)
- Tá dược vừa đủ

CHỈ ĐỊNH: Hạ cholesterol máu, điều hòa triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không dùng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian đông máu.

TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc có thể gây viêm da, dị ứng, ợ nóng, tiêu chảy.


CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống từ 2 - 4 viên/ngày, chia 2 lần, trước bữa ăn hoặc tùy theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

BẢO QUẢN: Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

SDK:
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS
ĐỀ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

**GMP - WHO
50 VIÊN NÉN**

DOGARLIC®



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp
(Đạt chứng nhận ISO 9001 - 2008 & ISO 13485)

COMPOSITION : Each tablet contains
- Garlic extract 5/1 (*Allium sativum* extract) 300 mg
(equivalent to 1500 mg fresh Garlic)
- Turmeric extract 4/1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg
(equivalent to 100 mg fresh Turmeric)
- Excipients s.q.f

INDICATIONS: Regulates blood pressure, triglyceridemia, cholesterolemia. Helps as a prophylactic against atherosclerosis.

CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity to components the drugs. Pregnant women, women after the birth do not have congestion do not use Dogarlic.

DRUG INTERACTIONS: Concomitant use of warfarin can increase coagulation time.

SIDE EFFECTS: The drugs can cause dermatitis, allergy, heartburn, diarrhea.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 2 - 4 tablets daily, twice per day before a meal or conform to prescription of your doctor.

STORAGE: Below 30°C, protect from direct light.

REGISTRATION NUMBER :
MANUFACTURER'S SPECIFICATION
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

Ngày SX-Số lô SX-HD:
Mfg. date-Lot No-Exp. date



c). Nhãn hộp 1 chai x 50 viên nén.

3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

Toa hướng dẫn sử dụng:

DOGARLIC®

* **Thành phần:** Mỗi viên nén chứa

- Cao tỏi 5/1 (*Allium sativum* extract) 300 mg
(tương đương 1500 mg tỏi tươi)

- Cao nghệ 4/1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg
(tương đương 100 mg nghệ tươi)

- Tá dược: Lactose, Sodium starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Aerosil vừa đủ 1 viên nén

* **Dạng bào chế:** Viên nén.

* **Qui cách đóng gói:**

- Hộp 2 vỉ x 10 viên nén.

- Hộp 1 chai x 50 viên nén.

- Hộp 1 chai x 100 viên nén.

* **Đặc tính dược lý:**

Dogarlic có tác dụng làm giảm cholesterol, điều hòa lipoprotein huyết thanh, phân hủy fibrin ở bệnh nhân vữa xơ động mạch, bảo vệ thành mạch, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

* **Chỉ định:**

Hạ cholesterol máu, điều hoà triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch.

* **Chống chỉ định:**

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không dùng.

* **Thận trọng:**

Người có rối loạn đông máu.

* **Tương tác thuốc:**

Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian đông máu.

* **Tác dụng phụ:**

Thuốc có thể gây viêm da, dị ứng, ợ nóng, tiêu chảy.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

* **Phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai.

- Tỏi qua nghiên cứu bài tiết qua sữa mẹ, không nên dùng khi chưa có chỉ định của Bác sĩ.

* **Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.**

* **Cách dùng và liều dùng:** Dùng uống

Dùng 2 – 4 viên /ngày, chia 2 lần trước bữa ăn hoặc tùy theo sự chỉ dẫn của Bác sĩ.

* **Quá liều và xử trí:**

Không có phản ứng có hại, tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

* **Khuyến cáo:**

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên nhãn.

- **Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng**, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

- **Đặt xa tầm tay trẻ em.**

* **Bảo quản:**

- Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* **Tiêu chuẩn áp dụng:** Tiêu chuẩn cơ sở.



Nơi sản xuất và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: 66 - Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Điện thoại : 067 – 3852278 – 3859370

