PHUC HUNG

P/H

THÀNH PHẦN (cho 125ml cao lỏng):

Ma hoàng	10g
Bán hạ	15g
Ngũ vị tử	10g
Tỳ bà diệp	10g
Cam thảo	10g
Tế tân	3g
Can khương	10g
Hạnh nhân	10g
Bối mẫu	10g
Trần bì	10g
Tá dược	vđ 125ml

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THUỐC HEN
P/H

P/H PHUC HUNG

CAO LỎNG 125ml

SĐK:

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

THUỐC HEN
P/H

THÀNH PHẦN: (cho 125ml cao lỏng):

Ma hoàng	10g
Bán hạ	15g
Ngũ vị tử	10g
Tỳ bà diệp	10g
Cam thảo	10g
Tế tân	3g
Can khương	10g
Hạnh nhân	10g
Bối mẫu	10g
Trần bì	10g
Tá dược	vđ 125ml

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

Số lô SX
Ngày SX:
HD :

CAO LỎNG 125ml

THUỐC HEN
P/H

P/H PHUC HUNG

THUỐC HEN
P/H

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Liều dùng: Ngày uống 2-3 lần, sau bữa ăn:
Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10-15 ml.
Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20 ml.
Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25-30 ml.
Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên
Đợt điều trị 8-10 tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

CAO LỎNG 125ml

THUỐC HEN
P/H

P/H PHUC HUNG

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 15-11-2016

S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH * Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI *
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

https://nhathuocngocanh.com/

382/8152

THUỐC HEN P/H

THÀNH PHẦN: (cho 250ml cao lỏng):

Ma hoàng	20g
Bán hạ	30g
Ngũ vị tử	20g
Tỳ bà diệp	20g
Cam thảo	20g
Tế tân	6g
Can khương	20g
Hạnh nhân	20g
Bối mẫu	20g
Trần bì	20g
Tá dược	vđ 250ml

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

CAO LỎNG 250ml

THUỐC HEN P/H

P/H PHUC HUNG

THUỐC HEN P/H

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Liều dùng: Ngày uống 2-3 lần, sau bữa ăn:
Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10-15 ml.
Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20 ml.
Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25-30 ml.
Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên
Đợt điều trị 8-10 tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

CAO LỎNG 250ml

THUỐC HEN P/H

P/H PHUC HUNG

THÀNH PHẦN (cho 250ml cao lỏng):

Ma hoàng	20g
Bán hạ	30g
Ngũ vị tử	20g
Tỳ bà diệp	20g
Cam thảo	20g
Tế tân	6g
Can khương	20g
Hạnh nhân	20g
Bối mẫu	20g
Trần bì	20g
Tá dược	vđ 250ml

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THUỐC HEN P/H

P/H PHUC HUNG

CAO LỎNG 250ml

SĐK:

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

M.S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH * Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI *
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

138.62.62

https://nhathuocngocanh.com/

https://nhathuocngocanh.com/

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC HEN P/H

Thành phần:

Thành phần	Cho 1 lọ x 125ml	Cho 1 lọ x 250ml
Ma hoàng (*Herba Ephedrae*)	10g	20g
Bán hạ (*Rhizoma Typhonii trilobati*)	15g	30g
Ngũ vị tử (*Fructus Schisandrae*)	10g	20g
Tỳ bà diệp (*Folium Eriobotryae*)	10g	20g
Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)	10g	20g
Tế tân (*Herba Asari*)	3g	6g
Can khương (*Rhizoma Zingiberis*)	10g	20g
Hạnh nhân (*Semen Armeniacae amarum*)	10g	20g
Bối mẫu (*Bulbus Fritillariae*)	10g	20g
Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae*)	10g	20g
Tá dược (Natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết)	vđ 125ml	vđ 250ml

Dạng bào chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng trong lọ nhựa. Hộp 1 lọ x 125ml, hộp 1 lọ x 250ml.

Chỉ định: Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

Cách dùng & liều dùng:

- Liều dùng: Ngày uống 2 - 3 lần, sau bữa ăn:
  Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.
  Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.
  Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml.
- Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên.
- Đợt điều trị 8 - 10 tuần.
- Sau khi kết thúc đợt điều trị, cơn hen nhẹ, thưa dần. Bệnh nhân cần điều trị thêm 3 - 4 đợt nữa, mỗi đợt cách nhau 1 tuần để phòng tránh cơn hen tái phát.
- Khi lên cơn hen, ngoài việc dùng Thuốc hen P/H, có thể phối hợp với các phương pháp chữa của y học hiện đại để làm hết cơn.

Tác dụng phụ: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người cao huyết áp, tự hãn.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua ....

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30^{0}C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222 Fax: 04. 33978024

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng