

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY TIẾP NHẬN  
HỒ SƠ QUẢNG CÁO THUỐC**

**Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc số: **01/2015/BHC**

Của: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C

Địa chỉ: **145 Đào Duy Anh, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08 3847 6670**

Đăng ký quảng cáo thuốc: **Briozcal**


Hình thức quảng cáo thuốc: **Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng**

Số giấy tiếp nhận: **0312a/15/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **18/08/2015**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015*

**KT. CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**




*Đỗ Văn Đông*



# BRIOZCAL

Calcium Carbonate  
Vitamin D3

1250 mg  
125 I.U.



Lý 18/08/2015

Tài liệu có 2 trang.  
Thông tin chi tiết sản phẩm vui lòng xem ở trang 2

NHÀ PHÂN PHỐI - TP. HCM  
Công Ty TNHH Dược phẩm BHC  
ĐC: 145 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận,  
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel (848) 3847 6670 – Fax: (848) 3997 0484

NHÀ PHÂN PHỐI - HÀ NỘI  
Công Ty TNHH Dược phẩm Hoàn Nguyên  
ĐC: Số 28 Trần Nhân Tông, P. Bùi Thị Xuân,  
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam  
Tel: (844) 3773 0954 – Fax: (844) 3773 0969

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: xxxx/xx/QLD-TT, ngày... tháng... năm...  
Ngày... tháng... năm... in tài liệu quảng cáo



## THÔNG TIN SẢN PHẨM

### VIEN NEN BRIOZCAL®

Bổ sung Canxi và Vitamin D3

VIEN NEN BRIOZCAL® là thuốc bổ sung canxi với hàm lượng 500mg kết hợp với Vitamin D3 trong một viên nén, là công thức thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển của xương và mô. Hấp thu đầy đủ canxi cho cơ thể sẽ làm giảm đi nguy cơ bị bệnh loãng xương.

**Dạng trình bày:** Hộp 30 viên, chia làm 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén.

<b>Mỗi viên nén bao film chứa:</b>	Canxi Carbonat (tương đương 500mg Canxi nguyên tố)	1250 mg
	Cholecalciferol (Vitamin D3)	125 IU

#### Chỉ định:

Viên nén Briozcal chứa Canxi Carbonate, yếu tố cơ bản cấu thành nên xương và Vitamin D3 có tính chất hỗ trợ sự hấp thu canxi vào cơ thể.

Phòng và điều trị bệnh loãng xương ở phụ nữ, người có tuổi, người hút thuốc lá, nghiện rượu và các đối tượng nguy cơ cao khác như: dùng corticoid kéo dài, sau chấn thương hoặc thời gian dài nằm bất động.

Điều trị các bệnh cồi xương, nhuyễn xương, tiêu xương cấp và mãn.

Bổ sung canxi, Vitamin D hàng ngày cho sự tăng trưởng hệ xương, răng của trẻ em, thanh thiếu niên, tuổi dậy thì.

Bổ sung canxi cho phụ nữ có thai, cho con bú, phòng ngừa các biến chứng do thiếu canxi cấp và mãn.

Đáp ứng nhu cầu bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu hụt do ăn kiêng, điều trị gãy xương, các bệnh tật khác (bệnh mắt, dị ứng, bệnh đường ruột lâu ngày...).

**Cách dùng** : Người lớn hoặc trẻ em tuỳ theo nhu cầu cung cấp canxi hàng ngày.  
Uống 1-2 viên mỗi ngày với 1 ly nước, uống sau khi ăn hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**Chống chỉ định** : Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, hội chứng tăng canxi huyết, tăng canxi niệu, sỏi canxi.  
Trong trường hợp nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến Thầy thuốc của bạn.

**Thận trọng** : Vitamin chỉ có thể trợ giúp khi không đủ chất dinh dưỡng. Cần kiểm tra thải trừ Canxi ở các bệnh nhân tăng canxi niệu nhẹ hay suy thận mãn hoặc có tạo sỏi thận. Nếu cần thiết phải giảm liều hoặc ngừng dùng thuốc.

**Đối tượng đặc biệt** : Phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không gây hại khi dùng đúng liều khuyến cáo.  
Bệnh nhân suy gan, người cao tuổi: Không cần phải điều chỉnh liều  
Bệnh nhân suy thận: Không cần phải điều chỉnh liều, nhưng cần kiểm tra thải trừ canxi ở các bệnh nhân tăng canxi niệu nhẹ hay suy thận mãn hoặc có tạo sỏi thận  
Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

**Tương tác thuốc** : Những thuốc sau đây ức chế thải trừ canxi qua thận: Các thiazid, clopamid, ciprofloxacin, chlorthalidon, thuốc chống co giật  
Canxi làm giảm hấp thụ demeclocyclin, doxycyclin, metacyclin, minocyclin, oxytetracyclin, tetracyclin, enoxacin, fleroxacin, levofloxacin, lomefloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, sắt, kẽm, và những chất khoáng thiết yếu khác.  
Canxi làm tăng độc tính đối với tim của các glycosid digitalis vì tăng nồng độ canxi huyết sẽ làm tăng tác dụng ức chế Na+, K+, ATPase của glycozid tim  
Glucocorticoid, phenytoin làm giảm hấp thu canxi qua đường tiêu hóa. Chế độ ăn có phytat, oxalat làm giảm hấp thu canxi vì tạo thành những phức hợp khó hấp thu  
Phosphat, calcitonin, natri sulfat, furosemid, magnesi, cholestyramin, estrogen, một số thuốc chống co giật cũng làm giảm canxi huyết  
Thuốc lợi niệu thiazid, trái lại làm tăng nồng độ canxi huyết

**Tác dụng ngoại ý** : Có thể gặp một số triệu chứng như táo bón, ra mồ hôi, mặt đỏ bừng và huyết áp thấp

**Quá liều** : Dùng liều quá cao có thể dẫn đến tăng canxi huyết, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận. Để điều trị, cần bù nước bằng cách uống hoặc truyền dịch, có thể dùng các thuốc lợi tiểu để tăng thải trừ canxi, nhưng không được dùng thuốc lợi tiểu nhóm thiazid vì chúng tăng tái hấp thu canxi ở thận. Ngoài ra có thể dùng các thuốc như calcitonin, bisphosphonate và plicamycin nếu các biện pháp trên không có hiệu quả.

**Hạn dùng** : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**Tiêu chuẩn** : Nhà sản xuất

**Bảo quản thuốc dưới 25 độ C. Không dùng nếu vi thuốc đã bị rách.**

**Để ngoài tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.** Thông báo cho bác sĩ bất kỳ tác dụng ngoại ý nào có trong khi sử dụng.