https://nhathuocngocanh.com/

MANESIX *Viên nén bao phim*

THÀNH PHẦN: Magnesi lactat dihydrat 470 mg (*tương đương với 1,97 mmol hay 48 mg Mg^{++}*), Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6) 5 mg và các tá dược gồm: Đường trắng, Tinh bột ngô, Gôm Arabic, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Opadry trắng, Opadry trong suốt, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên nén bao phim.

DẠNG BÀO CHẾ : Viên nén bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 5 vỉ x10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 viên, chai 500 viên và chai 1000 viên (dùng cho bệnh viện).

DƯỢC LỰC: Liệu pháp bằng Magnesi
Magnesi là một cation nội bào chủ yếu, nó làm giảm khả năng bị kích thích của tế bào thần kinh và sự dẫn truyền thần kinh cơ, cũng như tham dự vào nhiều phản ứng cần enzym xúc tác khác.
Việc thiếu Magnesi có thể là nguyên phát do bất thường bẩm sinh trong sự chuyển hóa Magnesi hay thứ phát do kém hấp thu; thiếu cung cấp hay do thải nhiều ở thận.Tình trạng thiếu Magnesi có thể được đánh giá qua kết quả định lượng Magnesi trong huyết tương: nếu kết quả từ 12 – 17 mg / lít là thiếu hụt vừa, nếu dưới 12 mg / lít là thiếu nặng. Một số biểu hiện có thể xuất hiện như: run, yếu cơ, cơn co cứng cơ, thất điều, tăng phản xạ, dễ kích thích, mất ngủ, rối loạn nhịp tim, rối loạn tiêu hóa v v... và một số trường hợp cần được bổ sung bằng thuốc uống hay tiêm. Pyridoxin (Vitamin B6) là một coenzym, can thiệp vào rất nhiều tiến trình chuyển hóa như chuyển hóa aminoacid, tổng hợp và thoái biến protein, tham gia tổng hợp Acid Gamma Aminobutyric (GABA) trong hệ thần kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobin… Ngoài ra sự phối hợp Vitamin B6 còn giúp Magnesi thâm nhập dễ dàng vào tế bào hơn.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:
- Điều trị các chứng thiếu hụt Magnesi đơn thuần hay kết hợp đã được xác nhận.
- Điều trị các rối loạn chức năng của những cơn lo âu đi kèm với tăng thông khí (tạng co giật).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Liều lượng:
- Thiếu Magnesi nặng: Người lớn 6 viên mỗi ngày, chia làm 3 lần. Trẻ em: 2 - 6 viên mỗi ngày tùy theo tuổi và tình trạng bệnh.
- Tạng co giật: Người lớn: 4 viên mỗi ngày, chia 2 lần.

Cách dùng:
Đường uống, nên chia liều trong ngày làm 2 - 3 lần và uống với nhiều nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Suy thận nặng với hệ số thanh thải < 30 ml / phút.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:
- Trường hợp thiếu Magnesi trầm trọng nên bắt đầu bằng dạng thuốc

https://nhathuocngocanh.com/

tiêm mạch.
- Trong trường hợp có thiếu Calci kết hợp với thiếu Magnesi thì phải bổ sung Magnesi trước khi bổ sung Calci.
- Dùng thận trọng cho người bị suy thận.
- Thận trọng khi dùng chung với Levodopa do có chứa Vitamin B6.
- Thận trọng khi dùng kết hợp với các Quinidin.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
- Các thuốc có chứa Phosphat và Calci ức chế sự hấp thu Magnesi tại ruột non phải dùng cách nhau ít nhất 3 giờ.
- Magnesi làm giảm hấp thu đối với Tetracyclin, nên dùng cách xa ít nhất 3 giờ.
- Magnesi làm giảm thanh thải các Quinidin đưa đến tăng nồng độ Quinidin trong máu, có nguy cơ gây quá liều.
- Vitamin B6 có thể làm giảm tác dụng của L- Dopa nếu không dùng kèm theo chất ức chế Dopa- decarboxylase ngoại biên.
- Vitamin B6 làm giảm tác dụng của Phenytoin, Phenobarbital ở một số người.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết.
- Do thiếu dữ liệu về thuốc qua sữa mẹ, nên tránh dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Không có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Trường hợp uống lượng lớn thuốc, có nguy cơ bị hội chứng vô niệu. Cần bù nước, dùng thuốc lợi tiểu mạnh, trường hợp suy thận cần thẩm phân lọc máu hay thẩm phân phúc mạc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Đôi khi xảy ra tiêu chảy, đau bụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

WHO-GMP

TOA MANESIX 14-G

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.
Email: info@bvpharma.com.vn