


Mẫu hộp giấy tuýp 30g




MẪU TUÝP 30gam



\* Ghi chú: Số lô sản xuất và hạn dùng được dập chìm ở đáy tuýp.


### Mẫu hộp giấy tuýp 10g



### Mẫu tuýp nhôm 10g



\* Ghi chú: Số lô sản xuất và hạn dùng được dập chìm ở đáy tuýp.



Mẫu tuýp nhôm 30g



\* Ghi chú: Số lô sản xuất và hạn dùng được dập chìm ở đáy tuýp.



# Mẫu tờ hướng dẫn sử dụng

## Tờ hướng dẫn sử dụng

### Kem bôi da **FORSANCORT** Hydrocortison acetat 1%

**CÔNG THỨC:** Mỗi 100 gam kem thuốc có chứa:

Hydrocortison acetat ..... 1g

Tá dược: Emulsifying wax, Cetostearyl alcohol, Vaseline, Glycerin, Propylen glycol, Polyoxyl castor oil, Nipagin, Nipasol, Na EDTA, Acid Citric, nước cất vừa đủ.....100 g

**CHỈ ĐỊNH:**

Được dùng ngoài để chữa các bệnh viêm da không nhiễm khuẩn, các bệnh eczema cấp và mạn do nhiều nguyên nhân khác nhau, ngứa vùng hậu môn- sinh dục và da bỏng nhiệt độ nhưng không nhiễm virus, vi khuẩn hay nấm bệnh.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Mẫn cảm với Hydrocortison.  
Người bị nhiễm khuẩn, nhiễm virus (thủy đậu, zona, herpes), nhiễm nấm hay ký sinh trùng, loét da.  
Không dùng trong nhãn khoa.

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**

Bôi một lớp mỏng thuốc lên vùng da bị bệnh, 1- 4 lần / ngày.  
Không dùng thuốc liên tục dài ngày ( Một đợt điều trị không quá 2 tuần)  
Nếu dùng thuốc trong thời gian dài, khi ngừng thuốc phải ngừng dần dần.

**THẬN TRỌNG:**

Tránh tiếp xúc với kết mạc mắt. Tránh bôi lên diện rộng, dùng trong thời gian dài thì phải quan tâm đến nguy cơ ức chế trục hạ đồi- tuyến yên- thượng thận. Dùng liều cao cần thận trọng với người bị loãng xương, loét dạ dày tá tràng, tăng huyết áp, lao.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Hydrocortison bài tiết qua sữa, gây nguy cơ cho trẻ nhỏ, thậm chí ngay cả với liều bình thường. Dùng thuốc kéo dài, liều cao sẽ gây nguy cơ ức chế vỏ thượng thận của thai. Vì vậy, phụ nữ có thai và cho con bú khi dùng phải có chỉ định và sự theo dõi của bác sỹ chuyên khoa.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Hydrocortison acetat dùng tại chỗ với liều thấp và hấp thu chậm qua da, thuốc có thời gian bán thải ngắn (100 phút) nên ít gây tương tác thuốc so với dùng đường toàn thân.

Tuy nhiên, dùng đồng thời với các thuốc chống viêm không steroid sẽ làm tăng tỉ lệ chảy máu và loét dạ dày tá tràng.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Hydrocortison acetat hấp thu chậm qua da, tùy vào diện tích và thời gian dùng thuốc, sự hấp thu của nó có thể gây ra suy vỏ thượng thận, Hội chứng Cushing. Một số tác dụng không mong muốn tại chỗ của thuốc bao gồm: viêm da tiếp xúc, mỏng da, teo da, chậm lành sẹo, mụn, rậm lông, mất sắc tố da.

**Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰC HỌC, ĐỘNG ĐỘNG HỌC:**

**\* Dược lực học:**

Hydrocortison là corticoid tiết từ vỏ thượng thận, thuộc nhóm glucocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, chống ngứa và ức chế miễn dịch. Dạng kem có chứa Hydrocortison 1% được dùng chữa các bệnh viêm da không nhiễm khuẩn và cũng được dùng cho da bỏng do nhiệt, nhưng không nhiễm virus, vi khuẩn hay nấm bệnh.

**\* Dược động học:**

Hydrocortison hấp thu tốt qua da, đặc biệt khi da bị tổn thương.  
Sau khi hấp thu, Hydrocortison chuyển hóa ở gan và ở hầu hết các mô trong cơ thể thành dạng hydro hóa và giáng hóa như Tetrahydrocortison và Tetrahydrocortisol. Các chất này được bài tiết qua nước tiểu, chủ yếu dưới dạng liên hiệp glucuronic và một lượng nhỏ dưới dạng không biến đổi.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Rất hiếm gặp quá liều gây nên ngộ độc cấp hoặc gây chết. Trong các trường hợp quá liều, không có thuốc đối kháng điển hình, chỉ điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng.

**LỜI KHUYẾN CÁO:**

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Để xa tầm tay trẻ em.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Tuýp 10 gam, hộp 1 tuýp. Tuýp 30 gam, hộp 1 tuýp

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp tuýp thuốc



**CTCP DƯỢC TW MEDI PHARCO-TENAMYD**

8 Nguyễn Trường Tộ - Tp. Huế - Việt Nam

**MEDI PHARCO**

ĐT: 054.3823099 - 3827215 Fax: 054.3826077



Huế, ngày 1 tháng 4 năm 2011  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*DS. Phạm Thị Bình*