

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

TATACA (Mebendazole 500mg)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa

Mebendazole 500 mg

Tá dược: Tinh bột bắp, PVP K30, Primellose, Talc, Magnesi stearat, Hydroxy propyl methyl cellulose, Polyethylenglycol 6000, Titan dioxyd, Ethanol.

TÍNH CHẤT

Diệt giun, sán, trứng của hầu hết các loại giun sán. Mebendazol làm thoái hóa vi cấu trúc hình ống trong bào chất của các ký sinh trùng và ức chế hấp thu glucose ở giai đoạn trưởng thành của giun sán ký sinh ở ruột non và ấu trùng của chúng ở mô, làm giảm tích lũy glucogen. Kết quả làm giảm ATP cần thiết cho sự sống và sinh trưởng của giun sán, từ đó làm chết các ký sinh trùng. Mebendazol không làm ảnh hưởng đến glucose trong huyết thanh người.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hay nhiều loại giun: giun đũa, giun móc, giun kim, giun tóc, giun xoắn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi:

- Các trường hợp nhiễm 1 hay nhiều loại giun sau: giun đũa, giun móc, giun kim, giun tóc: uống 1 viên 500mg duy nhất.
- Nhiễm giun xoắn ở người lớn: 200-400mg x 3 lần/ngày x 3 ngày, tiếp theo uống 400-500mg x 3 lần/ngày x 10 ngày.

Ngừa nhiễm giun lại sau mỗi 4-6 tháng.

Có thể nhai, hoặc nghiền nhỏ viên thuốc rồi trộn với thức ăn.

THẬN TRỌNG

- Thận trọng sử dụng ở phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai, phụ nữ cho con bú.
- Bệnh nhân suy gan, loét dạ dày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân bị mẫn cảm với thuốc.
- Không chỉ định cho trẻ em dưới 2 tuổi.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Sử dụng cùng với cimetidin có thể gây ức chế chuyển hóa mebendazole ở gan làm tăng nồng độ thuốc trong máu, nhất là khi điều trị kéo dài.
- Carbamazepin làm giảm nồng độ thuốc trong huyết tương và làm giảm đáp ứng trị liệu nếu cần dùng carbamazepin nên thay thế bằng acid valproic.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Điều trị liều cao gây dị ứng, sốt, ngứa, giảm bạch cầu trung tính, nổi mề đay. Các tác động này có hồi phục.

Rối loạn tiêu hóa: đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn rất hiếm khi xảy ra.

Khi xảy ra các tác dụng phụ của thuốc nên ngưng sử dụng thuốc và thông báo cho bác sĩ.

HẠN DÙNG 36 tháng.

BẢO QUẢN Nơi khô, mát. Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN TCCS.

TRÌNH BÀY Hộp 01 vỉ, vỉ 01 viên.

PYMEPHARCO

166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên

WHO - GMP