

TINECOL®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC Kem bôi ngoài da

THÀNH PHẦN:

Miconazol nitrat..... 0,12g
 Resorcinol..... 0,036g
 Tá dược vừa đủ6g
 (Cetostearyl alcohol, Glyceryl monostearat, Cetyl palmitate, Simusor, Parafin oil, Ceteareth 20, Light parafin, Tween 80, Nipasol, Nipagin, BHT, Hydrogenated castor oil, Propylenglycol, Titanium dioxyd, Nước RO).

MÔ TẢ SẢN PHẨM

DƯỢC LỰC HỌC: TINECOL chứa Miconazol nitrat là một loại thuốc imidazol tổng hợp có tác dụng chống nấm đối với các loại như: Aspergillus, Blastomyces, Candida, Cladosporium, Coccidioides, Epidermophyton, Histoplasma Madurella, Pityrosporon, Microsporon, Paracoccidioides, Phialophora, Pseudallescheria và Trichophyton. Miconazol nitrat cũng có tác dụng với vi khuẩn Gram dương.

* Miconazol nitrat có tác dụng ức chế tổng hợp ergosterol ở màng tế bào nấm gây ức chế sự sinh trưởng của tế bào vi khuẩn nấm. Khi dùng ngoài, Miconazol nitrat hấp thụ qua lớp sừng của da và hấp thụ vào máu dưới 1%.

* Resorcinol là một chất có tác dụng tại chỗ hủy sừng, được phối hợp nhằm mục đích làm tăng cơ hội tiếp xúc của hoạt chất Miconazol nitrat với vi nấm.

Do sự phối hợp giữa Resorcinol và Miconazol nitrat trong một chất nền kem nhũ tương nên kem TINECOL có một phổ diệt nấm rộng và cho hiệu quả trong điều trị: LÁC (hắc lào), LANG BEN, NẤM KẼ, NẤM MÓNG, NẤM TÓC VÀ CÁC LOẠI NẤM THÂN, khác...

TINECOL có khả năng trị lành nấm Candida ở da (Moniliasis). Kem thuốc TINECOL cho hiệu quả tốt đối với những tổn thương do nước ăn, lở kẽ ngón tay, ngón chân, lở khóe móng tay khóe móng chân do tiếp xúc quá nhiều với nước.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Do mức độ hấp thu vào máu dưới 1% là rất thấp so với liều thuốc bôi để điều trị những tổn thương nấm da khu trú nên thông thường ít được chú ý.

Trong máu có khoảng 90% Miconazol nitrat gắn với Protein huyết tương và được chuyển hóa ở gan thành các chất không còn tác dụng. Nửa đời ở giai đoạn giữa của Miconazol nitrat là 2,5 giờ, và nửa đời thải trừ kéo dài khoảng 24 giờ. Có từ 10-20% được thải trừ qua nước tiểu dưới dạng đã chuyển hóa.

CHỈ ĐỊNH:

TINECOL dùng bôi ngoài da để điều trị lác (hắc lào), lang ben, nấm kẽ nấm móng, nấm tóc và các loại nấm thân khác gây ra do Trichophyton rubrum, T.mentagrophytes và Epidermophyton floccosum; kem TINECOL trị lành nấm Candida ở da.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Bôi kem TINECOL mỗi ngày 2 lần (sáng và tối) đối với những dạng nấm thân không phải lang ben như: lác đồng tiền, nấm kẽ ở ben, ở nách, nấm móng tay móng chân, các dạng nấm tóc nấm da do candida (tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, và cutaneous). Đối với lang ben (nghĩa là tinea versicolor) nên bôi mỗi ngày 1 lần. Cần bôi kem thật đều để những hạt nhũ tương phân tán tốt trên toàn thể vùng da cần bôi.

Khi dùng kem thuốc TINECOL, các triệu chứng sẽ bớt rõ rệt trong 2-3 ngày đầu, nhưng đa số các trường hợp chỉ sau một lần đã có dấu hiệu giảm. Để tránh tái phát nên bôi liên tục ít nhất 2 tuần đối với các loại nấm thân (tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor) và nên kéo dài 4 tuần đối với các loại nấm gây tổn thương ở cẳng chân (tinea pedis). Riêng đối với lang ben (tinea versicolor), biểu hiện sạch vi nấm thấy được sau khi bôi kem thuốc TINECOL từ 12 - 14 ngày.

Sau sử dụng liên tục 4 tuần nhưng hiệu quả lâm sàng không thấy cải thiện rõ, đề nghị xem lại chẩn đoán.

● CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

TINECOL chống chỉ định với người bị dị ứng với một trong các thành phần của thuốc

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Ở động vật, Miconazol nitrat không thể hiện tác dụng sinh quái thai nhưng độc với thai khi cho uống liều cao. Ở người tác dụng này chưa rõ. Tuy nhiên, cũng như với các imidazol khác, nếu có thể nên tránh sử dụng cho người mang thai. Không tìm thấy Miconazol nitrat trong sữa người mẹ uống thuốc trong thời kỳ đang cho con bú.

NGƯỜI KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có ảnh hưởng đến sự tinh táo hay khả năng lái xe của người lái xe và vận hành máy móc.

● CÁC CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Không để thuốc kem **TINECOL** dính vào mắt.

● TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Dùng ngoài được coi là dung nạp tốt, nhưng đôi khi có thể gây kích ứng hoặc rát bỏng. Tránh bôi vào mắt

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Lưu ý: Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc

● QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ LÝ:

Trong những trường hợp dùng bôi da trên diện rộng và có những triệu chứng quá liều: nên xử lý sơ bộ bằng cách rửa sạch thuốc bôi trên da, truyền dung dịch nước muối đằng trương, sau đó điều trị các triệu chứng.

● DẠNG BÀO CHẾ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

TINECOL được đóng trong lọ nhựa 6g, có nút đậy kín. Chai được vào hộp kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. Đóng trong thùng carton.

● TRÌNH BÀY:

Hộp 1 lọ: 6g.

● HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

● TIÊU CHUẨN:

Đạt tiêu chuẩn cơ sở.

● BẢO QUẢN:

Bao bì kín, nhiệt độ không quá 30°C

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ
Để xa tầm tay trẻ em**



Sản xuất bởi:

Công ty TNHH Dược Phẩm DETAPHAM

324F/10 Hoàng Quốc Việt, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0292.3 840380 Fax: 0292.3 738055