

NHÃN SẢN PHẨM BIBISO

MEDISUN Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

BIBISO

10 VỈ x 10 VIÊN NANG MỀM

GMP-WHO

MEDISUN Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297

BIBISO

10 VỈ x 10 VIÊN NANG MỀM

GMP-WHO

BIBISO

SDK: XXXX

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao khô Bim bim: 5,25 mg
(Extractum Semen Pharbitidis)
Cao khô Actiso: 100 mg
(Extractum Cynarae siccum)
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg
(Extractum Glini oppositifoli siccum)
Tá dược: Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanilin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titan dioxyd, Oxyd sắt đen, Oxyd sắt đỏ, Green-S, vừa đủ 1 viên nang mềm.

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan cấp và mạn tính.
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do đống bia, rượu, thuốc hay hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí tiểu tiện, táo bón, ...
- Các bệnh dị ứng do bệnh gan gây ra như: Mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay, ...

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn: 2 - 4 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em: 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BẢO QUẢN:
Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCSS

ĐỂ XA TÀM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

MEDISUN Pharmaceutical Joint Stock Company
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
TEL: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297

BIBISO

10 BLISTERS X 10 SOFTGELS

GMP-WHO

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 16/5/2016

BIBISO

VISA: XXXX

COMPOSITION:

Each softgel contains:
Extractum Semen Pharbitidis: 5,25 mg
Extractum Cynarae siccum: 100 mg
Extractum Glini oppositifoli siccum: 75 mg
Excipients: Soybean oil, Lecithin, Beeswax, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titanium dioxide, Black & Red iron oxide, Green-S, q.s. 1 softgel.

INDICATION:

- Support for the treatment of acute and chronic hepatitis.
- Impaired liver function, especially due to beer, alcohol, drugs or chemicals.
- Hepatitis causes fatigue, jaundice, indigestion, urinary retention, constipation, ...
- Allergies caused by liver disease, such as pimples, sores itching, hives, ...

DOSAGE - USAGE:

- Adults: 2 - 4 softgels/time x 3 times/day.
- Children: 1 - 2 softgels/time x 3 times/day.

CONTRAINDICATIONS, SIDE-EFFECTS, INTERACTION AND OTHER INFORMATION:

Please read the leaflet in the box.
STORAGE:
Dry place, avoid the sunlight, below 30°C.
SPECIFICATION: MANUFACTURER

KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTION
BEFORE USE

BIBISO

Cao khô Bim bim: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

CTY CP DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bim bim: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

CTY CP DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bim bim: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

CTY CP DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bim bim: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

CTY CP DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bim bim: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

CTY CP DƯỢC PHẨM ME DI SUN

Số lô SX: xxx HD: xxx

Số lô SX:
NSX:

HD:



AS/AS

NHÃN SẢN PHẨM BIBISO

MEDISUN Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

BIBISO

05 VỈ x 10 VIÊN NANG MỀM

GMP-WHO

MEDISUN Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297

BIBISO

05 VỈ x 10 VIÊN NANG MỀM

GMP-WHO

BIBISO

SDK: XXXX

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao khô Bìm bìm: 5,25 mg
(Extractum Semen Pharbitidis)
Cao khô Actiso: 100 mg
(Extractum Cynarae siccum)
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg
(Extractum Glini oppositifolii siccum)
Tá dược: Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanilin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titan dioxyd, Oxyd sắt đen, Oxyd sắt đỏ, Green-S, vừa đủ 1 viên nang mềm.

CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan cấp và mạn tính.
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng bia, rượu, thuốc hay hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí tiểu tiện, táo bón ...
- Các bệnh dị ứng do bệnh gan gây ra như: Mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay, ...

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn: 2 - 4 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em: 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN:

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

MEDISUN Pharmaceutical Joint Stock Company
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
TEL: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297

BIBISO

05 BLISTERS x 10 SOFTGELS

GMP-WHO

BIBISO

VISA: XXXX

COMPOSITION:

Each softgel contains:
Extractum Semen Pharbitidis: 5.25 mg
Extractum Cynarae siccum: 100 mg
Extractum Glini oppositifolii siccum: 75 mg
Excipients: Soybean oil, Lecithin, Beeswax, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titanium dioxide, Black & Red iron oxide, Green-S, q.s. 1 softgel.

INDICATION:

- Support for the treatment of acute and chronic hepatitis.
- Impaired liver function, especially due to beer, alcohol, drugs or chemicals.
- Hepatitis causes fatigue, jaundice, indigestion, urinary retention, constipation, ...
- Allergies caused by liver disease, such as pimples, sores itching, hives, ...

DOSEAGE - USAGE:

- Adults: 2 - 4 softgels/time x 3 times/day.
- Children: 1 - 2 softgels/time x 3 times/day.

CONTRAINDICATIONS, SIDE-EFFECTS, INTERACTION AND OTHER INFORMATION:

Please read the leaflet in the box.

STORAGE:

Dry place, avoid the sunlight, below 30°C.

SPECIFICATION: MANUFACTURER

KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTION
BEFORE USE

BIBISO

Cao khô Bìm bìm: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

BIBISO

CITY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bìm bìm: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

BIBISO

CITY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bìm bìm: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

BIBISO

CITY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bìm bìm: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

BIBISO

CITY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

BIBISO

Cao khô Bìm bìm: 5,25 mg
Cao khô Actiso: 100 mg
Cao khô Rau đắng đất: 75 mg

BIBISO

CITY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

Số lô SX: xxx HD: xxx

Số lô SX:
NSX:

HD:



MEDISUN



Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sỹ

BIBISO

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên

Công thức: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô Bìm bìm (<i>Extractum Semen Pharbitidis</i>)	5,25 mg
Cao khô Actiso (<i>Extractum Cynarae siccum</i>)	100,0 mg
Cao khô Rau đắng đất (<i>Extractum Glini oppositifolii siccum</i>)	75,0 mg

Tá dược :

(Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol , Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl Paraben, Titan dioxyd, Oxyd sắt đen, Oxyd sắt đỏ, Green – S, Nước tinh khiết) vđ 1 viên nang mềm.

Dạng bào chế: viên nang mềm.

Tính chất

Artiso có tác dụng lợi mật, kích thích tiêu hóa, hạ cholesterol huyết và rất hiệu quả đối với các chứng bệnh về gan mật.

Bìm Bìm chứa Pharbitin làm tăng sự co bóp của ruột, được dùng rộng rãi trong dân gian làm thuốc nhuận trường, lợi tiểu, thông mật.

Rau đắng đất có tác dụng lợi tiêu hóa, nhuận gan, ích mật, thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, hạ nhiệt.

Chỉ định

- Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan cấp và mãn tính.
- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng bia, rượu, thuốc hay hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí tiểu tiện, táo bón ...
- Các bệnh dị ứng do bệnh gan gây ra như: mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay ...

Chống chỉ định

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người đang tiêu chảy.

MEDISUN



Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn : 2-4 viên/lần, 3 lần/ ngày.
- Trẻ em : 1-2 viên/lần, 3 lần/ ngày.

Tương tác thuốc

Chưa tìm thấy tài liệu

Thận trọng

- Quá mẫn cảm với một trong của thành phần của thuốc

Phụ nữ có thai và cho con bú

Không sử dụng thuốc phụ nữ có thai, và đang cho con bú.

Quá liều và xử trí

Chưa có báo cáo.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây buồn ngủ nên có thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn


Thông báo với bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30⁰C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-B-003-08

Logo công ty: 

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: 521 ấp An Lợi, xã Hoà Lợi, H.Bến Cát, T.Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3589036 – Fax: 0650 3589297



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy