

MẪU NHÃN CHAI NADY-PHYTOL DUNG DỊCH UỐNG
CHAI 120ml

Dung dịch uống
Nady-Phytol
Chai 120ml



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HỒ CHÍ MINH
NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

CÔNG THỨC: Cao lỏng Actiso 108ml
(Tương ứng 108g dược liệu actiso (*Folium Cynarae scolymii*))
Tá dược vd 120ml

CHỈ ĐỊNH:
- LỢI MẬT, THÔNG MẬT.
- CHỦ TRỊ: TIÊU HÓA KÉM, VIÊM GAN, VIÊM TỤ MẬT, SỎI MẬT.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Người lớn: Uống mỗi lần 1 muỗng cà phê (5ml), ngày 2 lần.
Trẻ em: Uống mỗi lần ½ muỗng cà phê (2,5ml), ngày 2 lần.
Pha thuốc trong một chút nước đường để uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS Số lô SX/ Lot: HD/ Exp:
SDK: NSX/ Mfg:

NADYPHAR

Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám Đốc



MẪU HỘP NADY-PHYTOL DUNG DỊCH UỐNG
CHAI 120ml

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP. HỒ CHÍ MINH
NHÀ MÁY: 930 C4, Đường C, KCN Cai Lát, cụm 2,
P. Thành Mỹ Lân, Q. 2, TP. HCM

Nady-Phytol
Dung dịch uống

COMPOSITION:
Cynara scolymus Extract 108ml
(Equivalent to 108g of *Folium Cynarae scolymii*)
Excipients s.q.f 120ml

INDICATIONS:
- CHOLERETIC, CHOLAGOGUE,
- TREATMENT OF: DIGESTION DISORDERS,
LIVER AND GALLBLADER INSUFFICIENCIES,
GALLSTONE DISEASE.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:
Recommended dosage or as prescribed by the physician,
usually:
Adults: Orally 1 teaspoonful (5ml), twice daily.
Children: Orally ½ teaspoonful (2.5ml), twice daily.
Dilute with water, with or without sucrose.

**CONTRAINDICATIONS
AND THE OTHER INFORMATION:**
Read the leaflet inside.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE**

STORAGE: Not more than 30°C, in dry place,
protect from light.

Oral solution

Nady-Phytol

Box of 1 bottle of 120 ml



CÔNG THỨC:
Cao lỏng Actiso 108ml
(Tương ứng 108g dược liệu actiso (*Folium Cynarae scolymii*))
Tá dược vd 120ml

CHỈ ĐỊNH:
- LỢI MẬT, THÔNG MẬT.
- CHỦ TRỊ: TIÊU HÓA KÉM, VIÊM GAN,
VIÊM TÚI MẬT, SỎI MẬT.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Người lớn: Uống mỗi lần 1 muỗng cà phê (5ml),
ngày 2 lần.
Trẻ em: Uống mỗi lần ½ muỗng cà phê (2,5ml),
ngày 2 lần.
Pha thuốc trong một chút nước đường để uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo,
tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS
SDK:

Số lô SX/ Lot:
NSX/ Mfg:

HD/ Exp:

Dung dịch uống

Nady-Phytol

Hộp 1 chai 120ml



Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám Đốc
P. TÔNG GIÀM ĐỐC
DƯỢC PHẨM
2-9
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 11- TP. HỒ CHÍ MINH
DS. Bùi Ngọc Hồng

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH UỐNG NADY-PHYTOL CHAI 120 ml

NADY-PHYTOL

Dung dịch uống

CÔNG THỨC:

Cao lỏng actisô 108 ml
(Tương ứng 108 g dược liệu actisô (*Folium Cynarae scolymii*))
Tá dược: Methyl hydroxybenzoat, ethanol 96%,
propyl hydroxybenzoat, hương chuối, caramel,
nước tinh khiết vừa đủ 120 ml

CHỈ ĐỊNH:

Lợi mật, thông mật. Chủ trị: Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Nghiền đường mật, suy tế bào gan.
- Người dương hư, tỷ vị hư hàn, thể hàn.

THẬN TRỌNG:

Trường hợp bị tiêu chảy hay đau bụng nên gián đoạn việc dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Do tác dụng lợi tiêu của actisô nên có thể rút ngắn thời gian di chuyển của thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của các thuốc uống cùng, vì vậy nên uống cách xa những thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Dùng liều cao có thể gây tiêu chảy.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Các đặc tính dược lực học:

- Tính vị quy kinh: Khô, lương. Vào các kinh can, đởm.
- Công năng chủ trị: Lợi mật, chỉ thống. Chủ trị: Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật.
- Actisô có tác dụng lợi mật do cynarin, công thức là acid 1-4 dicaffein quinic ($C_{21}H_{34}O_{12} \cdot H_2O$), ngoài ra cũng xác định được hỗn hợp các thành phần khác của actisô, chủ yếu là acid-alcool tạo nên hoạt lực lợi mật, thông mật và còn có những tác dụng khác như giảm cholesterol-huyết, bảo vệ gan, làm tăng sự bài tiết.
- Cao lỏng actisô được chiết xuất từ dược liệu thiên nhiên, có tác dụng kích thích sự bài tiết mật, kích thích tiêu hóa và tăng cường chức năng bài tiết thận và tiêu hóa.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Rối loạn nước và điện giải. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc, trung bình:

- Người lớn: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê (5 ml), ngày 2 lần.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1/4 muỗng cà phê (2,5 ml), ngày 2 lần.

Cách dùng: Pha thuốc trong một chút nước đường để uống.

Trình bày: Hộp 1 chai 120 ml

Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất: Theo TCCS

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SĨ**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM
ĐT: (08) 38687355 FAX: 84.8.38687356
NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cái Lái, cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM



TUẦN CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Lô Minh Hùng

Ngày 06 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

