

Hướng dẫn sử dụng thuốc

INTER-VAS

(Cao khô lá Bạch quả 80mg)



- **Dạng thuốc:** Viên nén bao phim
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
- **Thành phần:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô lá Bạch quả	80mg
<i>(Extractum Folium Ginkgo biloba siccus)</i>	
tương ứng flavonol glycosid toàn phần	20mg
Tá dược vđ	1 viên

(Tá dược gồm: Tinh bột sắn, amidon, lactose, gelatin, magnesi stearat, bột talc, nipasol, nipagin, HPMC, PEG 6000, phẩm màu Chlorophylls, phẩm màu Tartrazin, titan dioxyd)

- **Chỉ định:**

- * Giảm trí nhớ, kém tập trung tư tưởng, đặc biệt ở người cao tuổi để chống stress.
- * Các triệu chứng đau do suy tuần hoàn ở động mạch ngoại vi như đau thắt khi đi, rối loạn dinh dưỡng...
- * Thiếu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thị lực và vài chứng suy võng mạc mắt do thiếu máu cục bộ.
- * Thuốc còn dùng trong chứng đau cách hồi do tắc động mạch chi dưới mạn tính, hội chứng Raynaud.

- **Cách dùng- liều dùng:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên x 3 lần/ngày.

Uống vào trước các bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

- **Chống chỉ định:** Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 12 tuổi. Giai đoạn cấp của tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp, hạ huyết áp.
- **Thận trọng:** Thuốc không phải là thuốc hạ huyết áp vì vậy không thể thay thế cho các thuốc điều trị cao huyết áp. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú khi thật cần thiết theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Nhẹ và hiếm gặp có thể gây rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, chóng mặt, dị ứng da, hạ huyết áp, đánh trống ngực, có thể gây rối loạn chảy máu.



* Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Không nên dùng đồng thời với thuốc chống đông máu hoặc aspirin, thuốc chi huyết, thuốc chống đông kinh, thuốc trầm cảm. Thuốc hấp thu tốt ở phần trên đường tiêu hoá, dùng thuốc vào bữa ăn đảm bảo hấp thu thuốc nhanh và hoàn toàn vì thuốc lưu lại lâu ở đường tiêu hoá.

- Sử dụng quá liều: Chưa có tài liệu báo cáo

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

-Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM

" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ, dược sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685

fax: 04.33829054



TUỢC CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

