

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Để xa tầm tay trẻ em**

**Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn  
gặp phải khi sử dụng thuốc**

**Thành phần, hàm lượng của thuốc:**

Citicolin 500 mg

Tá dược: Microcrystallin cellulose, tinh bột mì, croscarmellose sodium, talc, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, titan dioxyd vừa đủ 1 viên.

**Mô tả sản phẩm:** Viên nén dài, thuôn hai đầu, một mặt trơn, một mặt có vạch ngang ở giữa, bao phim màu trắng, bên trong màu trắng.

**Qui cách đóng gói:** Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

### **Thuốc dùng cho bệnh gì:**

- Hỗ trợ phục hồi vận động với bệnh nhân liệt nửa người sau tai biến mạch máu não.
- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng.
- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não.
- Rối loạn trí nhớ và hành vi liên quan đến mạch máu não: hoa mắt, nhức đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, thờ ơ mất định hướng, giảm hoạt động và vận động, giảm sút sự tập trung.

### **Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:**

Liều thường dùng: uống 1-2 viên/ngày.

- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não: 1 viên/lần, 1-2 lần/ngày.
- Hỗ trợ phục hồi vận động với bệnh nhân liệt nửa người sau tai biến mạch máu não: 2 viên/lần/ngày, trong 3-4 lần.

- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng: 1 viên/lần/ngày, trong 3-4 tuần.

**ai nào không nên dùng thuốc này:**

- Quá mẫn cảm với thành phần của thuốc
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

### **Tác dụng không mong muốn:**

Thuốc nói chung rất dễ dung nạp. Trong một số trường hợp, có rối loạn nhẹ ở đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn, rối loạn thượng vị, tiêu chảy) mệt mỏi, nhức đầu, kích động. Thỉnh thoảng có thể gặp hạ huyết áp kèm nhịp tim chậm hoặc nhịp tim nhanh.

**Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn  
gặp phải khi sử dụng thuốc**

**Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi  
đang sử dụng thuốc này:**

Không phối hợp với meclofenoxate hoặc centrofenoxin. Do Citicolin làm tăng hiệu lực của levodopa, nên cần thận trọng khi phối hợp với 2 loại thuốc này.

### **Cần làm gì khi một lần quên dùng thuốc:**

Khi một lần quên dùng thuốc, hãy uống thuốc ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu như gần đến thời gian uống liều kế tiếp, thì bỏ qua liều đã quên. Không nên uống liều gấp đôi để bù cho một liều đã quên.

### **Cần bảo quản thuốc này như thế nào:**

Bảo quản thuốc ở nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

### **Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:**

Chưa có báo cáo về quá liều.

### **Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:**

Trong trường hợp uống quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

### **Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:**

Citicolin không làm hạ huyết áp kéo dài, nên không thể thay thế được các thuốc chống tăng huyết áp. Chưa rõ ảnh hưởng do tích lũy thuốc trong cơ thể hoặc do nghiên thuốc.

### **\* Trường hợp phụ nữ có thai và cho con bú:**

Phụ nữ mang thai và cho con bú chỉ sử dụng thuốc khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ có thể xảy ra và phải tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

### **\* Trường hợp lái xe và vận hành máy móc:**

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

**Khi nào cần tham vấn Bác sĩ, Dược sĩ:**

Nếu bạn cảm thấy bất thường trong khi dùng thuốc, nên liên lạc với bác sĩ của bạn.

**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ:**

**Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ**

**Dược lực học:**

Citicolin là một dẫn xuất của cholin và cytidin, nó tham gia vào quá trình sinh tổng hợp lecithin. Citicolin làm tăng lưu lượng máu và tiêu thụ oxy ở não, được dùng trong điều trị các rối loạn mạch máu não như thiếu máu cục bộ như đột quỵ, Parkinson và chấn thương đầu.

**Dược động học:**

Nghiên cứu dược động học trên người lớn khỏe mạnh sau khi uống, cho thấy citicolin được hấp thu nhanh chóng. Citicolin được chuyển hóa ở thành ruột và gan. Các sản phẩm phụ của citicolin ngoại sinh được hình thành do sự thủy phân trong ruột là cholin và cytidin. Sau khi hấp thu, cholin và cytidin được phân bố khắp cơ thể, đi vào hệ tuần hoàn và qua hàng rào máu não tái tổng hợp thành citicolin trong não. Sự thải trừ citicolin chủ yếu qua đường hô hấp, qua nước tiểu, và ít hơn 1% bài tiết trong phân.

**Chỉ định:**

- Hỗ trợ phục hồi vận động với bệnh nhân liệt nửa người sau tai biến mạch máu não.
- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng.
- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não.
- Rối loạn trí nhớ và hành vi liên quan đến mạch máu não: hoa mắt, nhức đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, thờ ơ mất định hướng, giảm hoạt động và vận động, giảm sút sự tập trung.

**Liều lượng và cách dùng:**

Liều thường dùng: uống 1-2 viên/ngày.

- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não: 1 viên/lần, 1-2 lần/ngày.
- Hỗ trợ phục hồi vận động với bệnh nhân liệt nửa người

sau tai biến mạch máu não: 2 viên/lần/ngày, trong 3-4 tuần.  
- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng: 1 viên/lần/ngày, trong 3-4 tuần.

**Chống chỉ định:**

- Quá mẫn cảm với thành phần của thuốc
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

**Thận trọng:**

Citicolin không làm hạ huyết áp kéo dài, nên không thể thay thế được các thuốc chống tăng huyết áp. Chưa rõ ảnh hưởng do tích lũy thuốc trong cơ thể hoặc do nghiện thuốc.

**\* Trường hợp phụ nữ có thai và cho con bú:**

Phụ nữ mang thai và cho con bú chỉ sử dụng thuốc khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ có thể xảy ra và phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

**\* Trường hợp lái xe và vận hành máy móc:**

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

**Tương tác thuốc:**

Không phối hợp với meclofenoxate hoặc centrofenoxin. Do Citicolin làm tăng hiệu lực của levodopa, nên cần thận trọng khi phối hợp với 2 loại thuốc này.

**Tác dụng không mong muốn:**

Thuốc nói chung rất dễ dung nạp. Trong một số trường hợp, có rối loạn nhẹ ở đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn, rối loạn thượng vị, tiêu chảy) mệt mỏi, nhức đầu, kích động. Thỉnh thoảng có thể gặp hạ huyết áp kèm nhịp tim chậm hoặc nhịp tim nhanh.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

**Quá liều và cách xử trí:**

Chưa có báo cáo về quá liều. Trong trường hợp uống quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

**Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:** 22/6/2017



MEYER-BPC  
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC  
Số 6A3 quốc lộ 60B, Phù Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam