

Rx

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Để thuốc ngoài tầm tay trẻ em. Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Colposeptine®

CHLORQUINALDOL - PROMESTRIENE

Viên nén đặt phụ khoa

Thành phần:

Mỗi viên có chứa:

- **Hoạt chất:**

Chlorquinadol (INN) 0,200 g

Promestriene (INN) 0,010 g

- **Tá dược:** lactose, cellulose, sodium laurylsulfate, boric acid, magnesium stearate.

Chỉ định:

Huyết trắng âm đạo do tất cả các tác nhân gây bệnh, ngoại trừ do lâu cầu.

Liều lượng và cách dùng:

- **Liều lượng:**

Mỗi ngày một viên nén phụ khoa, trong 18 ngày liên tiếp, ngay cả khi đang hành kinh.

Liều lượng trên đây chỉ có tính cách chỉ dẫn, bác sĩ có thể chỉnh liều cho thích hợp

- **Cách dùng:**

Dùng qua đường âm đạo

Đặt viên thuốc, đã được nhúng ướt, vào sâu trong âm đạo, nên đặt buổi tối trước khi đi ngủ.

Chống chỉ định:

Mắc dầu không thấy có tác dụng toàn thân sau khi dùng thuốc này, nhưng cần thận trọng giống như đối với tất cả các estrogen, không nên dùng sản phẩm này trên bệnh nhân có tiền sử ung thư lợt thuộc estrogen.

Cảnh báo và thận trọng:

Không

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Khi sử dụng bằng đường âm đạo, Colposeptine chỉ có tác dụng tại chỗ và hầu như không hấp thu vào cơ thể. Sử dụng thuốc này cho phụ nữ mang thai và cho con bú phải tuân theo ý kiến của bác sĩ.

Tương tác thuốc và các tương tác khác:

Tất cả các thuốc dùng đường âm đạo có thể làm mất tác dụng của phương pháp tránh thai diệt tinh trùng tại chỗ.

Để tránh tương tác thuốc xảy ra, phải luôn thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn về bất cứ loại thuốc nào mà bạn đang dùng.

Ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn:

Không nhận thấy tác dụng phụ nào liên quan đến thuốc.

Thông báo cho bác sĩ bất kỳ tác dụng không mong muốn nào gặp phải.

Quá liều:

Do sử dụng bằng đường âm đạo nên gần như không có nguy cơ xảy ra quá liều khi sử dụng Colposeptine.

Ngưng sử dụng nếu nghi ngờ quá liều.

Các đặc tính dược lý:

Dược lực học:

Chlorquinaldol là một chất sát khuẩn có tác dụng kìm khuẩn trên một số loại mầm bệnh.

Promestriene có tác động estrogen tại chỗ trên niêm mạc của đường sinh dục dưới và do vậy làm phục hồi sự dinh dưỡng của niêm mạc. Nó tái tạo các tế bào bề mặt giàu glycogen của biểu mô âm đạo. Khi đó, glycogen làm nhiệm vụ như một chất nền cho vi khuẩn lactic, giúp phục hồi pH sinh lý của âm đạo và vì thế ngăn chặn sự tái nhiễm trùng.

Promestriene chỉ được sử dụng tại chỗ và do đó không gây bất cứ tác động estrogen nào trên các cơ quan xa ngoài âm đạo, đặc biệt như là trên tử cung, tuyến vú và tuyến yên.

Dược động học:

Chlorquinaldol là chất sát khuẩn tiếp xúc với sự hấp thu thấp ở niêm mạc âm đạo.

Khi sử dụng tại chỗ ở người, promestriene có 3 đặc điểm riêng biệt:

- Không tích lũy trong mô và thời gian bán thải sinh học không quá 24 giờ
- Khi bôi lên da, không quá 1% promestriene ngấm vào toàn thân.
- Khi sử dụng đường âm đạo, không thấy có tác dụng hormone toàn thân, nhất là ở các cơ quan nhạy cảm estrogen nằm ở xa ngoài âm đạo.
- Khi sử dụng bằng đường dùng toàn thân cho động vật, promestriene, là một dạng estradiol dietheroxide, sẽ trải qua sự khử alkyl để phóng thích 2 monoether (ở vị trí 3 và 17 beta) rồi được đào thải nguyên dạng hoặc một phần bị biến đổi thành estradiol.

Điều kiện bảo quản:

Bảo quản dưới 30°C.

Hạn dùng:

60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng:

Nhà sản xuất.

Đóng gói:

Hộp 03 vỉ x 06 viên.

Sản xuất bởi:

Laboratoire Theramex

6 Avenue Albert II – B.P.59, MC 98007 Monaco Cedex- Monaco

Không được dùng thuốc quá hạn ghi trên vỏ hộp

Không được uống