


Rx Prescription medicine

ROLAPAIN Capsule
Thymomodulin 80mg

Rx Prescription medicine Box of 6 blis. x 10 caps.

For Allergic Diseases and Immune System Reinforcement

ROLAPAIN Capsule
Thymomodulin 80mg



GMP

Manufactured by:
CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.
1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

Rx Thuốc kê đơn

COMPOSITION:
Each capsule contains:
Thymomodulin 80mg

DOSAGE & ADMINISTRATION/ INDICATION/ CONTRAINDICATION/ SIDE EFFECTS/ PRECAUTION:
Please read the insert inside.

SHELF-LIFE:
36 months from the manufacturing date.

STORAGE:
Store in tight container, avoid sunlight, at temperature < 30°C.

PACKING:
Box of 6 blisters x 10 capsules.

Số Lô/ Lot No. :
NSX/ Mfg. Date:
HD/ Exp. Date :
Số ĐK/ Visa No.:


KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAREFULLY READ THE INSTRUCTION BEFORE USE

Rx Thuốc kê đơn

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

For Allergic Diseases and Immune System Reinforcement

ROLAPAIN Viên nang
Thymomodulin 80mg



GMP

Sản xuất bởi:
CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.
1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

TÊN THUỐC: Viên nang ROLAPAIN

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nang chứa:
Thymomodulin 80mg

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG/ CHỈ ĐỊNH/ CHỐNG CHỈ ĐỊNH/ TÁC DỤNG PHỤ/ LƯU Ý:
Vui lòng đọc tờ hướng dẫn sử dụng bên trong.

HẠN DÙNG:
36 tháng từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:
Trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ < 30°C.


ĐÓNG GÓI:
Hộp 6 vỉ x 10 viên nang.

XUẤT XỨ: Hàn Quốc.

Nhà sản xuất:
CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.
1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

Nhà nhập khẩu:

ĐỀ XA TÂM VỚI TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐỀ NGHỊ XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/ 9 / 2014

Color Code: C=20, Y=20

53/87

Rx - Thuốc bán theo đơn

ROLAPAIN Capsule
Viên nang Thymomodulin 80,0 mg

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT

- * Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- * Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- * Thuốc này chỉ được bán theo đơn của Bác sĩ.
- * Không dùng quá liều chỉ định
- * Xin thông báo cho Bác sĩ biết nếu xảy ra bất kỳ tác dụng ngoại ý nào trong quá trình sử dụng.
- * Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.
- * Để thuốc xa tầm với của trẻ em.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang có chứa:

Hoạt chất chính: Thymomodulin.....80,0 mg

Tá dược: Light anhydrous silicic acid, Sodium lauryl sulfate, Carboxymethyl cellulose calcium; Corn starch, Magnesium stearate, Methyl parahydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate.

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ:

Thymomodulin có tác dụng điều hòa miễn dịch trên mô hình thử nghiệm.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc được chỉ định trong các trường hợp sau:

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn.
- Viêm mũi dị ứng.
- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn.
- Hỗ trợ cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- *Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn:* Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 4-6 tháng.
- *Viêm mũi dị ứng:* Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 4 tháng.
- *Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn:* Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 3-6 tháng.
- *Hỗ trợ cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS:* Liều dùng 60mg/ngày, dùng trong thời gian 50 ngày.
- *Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi:* Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 6 tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc đang nghi ngờ có thai.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.



THẬN TRỌNG

Chưa có báo cáo.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không có bằng chứng **ROLAPAIN** có tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy móc của bệnh nhân.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ ĐANG CHO CON BÚ

Sử dụng cho phụ nữ có thai:

Trên thí nghiệm, chuột và thỏ cái được dùng **ROLAPAIN**. Ở liều lần lượt là 1mg/kg và 0.5mg/kg, trong suốt thai kỳ cho đến khi chuyển dạ tự nhiên. Không quan sát thấy hiện tượng sinh u quái sau khi dùng **ROLAPAIN**, cũng như cho thấy các chỉ số bình thường của tỷ lệ động vật có thai, số lượng và trọng lượng của thai, tái hấp thu, số lượng nhân hoá xương, đường kính của xương. Tuy nhiên, cũng như mọi thuốc khác, nên tránh dùng thuốc trong thai kỳ, trừ khi được bác sĩ chỉ định.

Sử dụng trong thời gian cho con bú:

Chưa xác định rõ tính an toàn khi dùng thuốc cho bà mẹ đang cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Các phản ứng dị ứng có thể xảy ra trên các bệnh nhân quá mẫn.

QUÁ LIỀU

Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Nhà sản xuất.

BẢO QUẢN: Giữ thuốc trong bao bì kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 10 viên/vỉ, 6 vỉ/hộp

HẠN DÙNG: 36 tháng tính từ ngày sản xuất.

Được sản xuất bởi:

CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.

1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng



