

Eutavos K2®

Thành phần trong viên nang:

- Calcium carbonate: 400mg
- Magnesium oxide: 187,5mg
- Vitamin K2 (menaquinone): 75mcg
- VitaminD3(cholecalciferol): 5mcg
- Bao gồm tá dược vừa đủ.

Dạng bào chế:

Viên nang cứng màu trắng bóng dễ uống.

Dược lý lâm sàng:

Eutavos K2 là sản phẩm được sản xuất trên công nghệ hiện đại có công thức đặc đáo, được khuyến cáo bởi các quỹ lý thực phẩm và được phẩm chất EU (EU) quy định số 1169/2011 Khi sử dụng, nhận thấy cải thiện các dấu hiệu trên lâm sàng trong chuyên "khoa xương khớp", do là sự phối hợp khoa học giữa các hoạt chất sinh học Calcium carbonat; Magnesium oxide; Vitamin K2 (menaquinone); Vitamin D3(cholecalciferol). Giúp bổ sung vitamin và khoáng chất cho xương, hỗ trợ quá trình tạo xương. Giúp xương rắn chắc khỏe, hạn chế được tình trạng loãng xương, làm chậm quá trình mất xương do tuổi tác.

Cơ chế và tác dụng:

Calci là một khoáng chất không thể thiếu trong cơ thể, vì vậy giúp bổ sung cho xương và răng được chắc khỏe mà nó còn có vai trò then chốt trong tất cả các quá trình sinh học.

Vitamin K2 có vai trò hòa hóa protein. Giúp kết nối calci gắn với ion calci trong máu một cách dễ dàng để đưa calci vào xương đúng chỗ nhất, đồng thời ngăn không cho chúng lắng đọng xuống thành mạch. Do đó giúp ngăn ngừa voi hóa mạch máu, giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạch máu do xơ vữa động mạch.

Vitamin D3 có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì nồng độ calci trong máu. Ngoài ra nó tham gia vào điều hòa chức năng một số gen và một số chức năng bài tiết của insulin, hormone cận giáp, hệ miễn dịch, phát triển hệ sinh sản.

Magnesium có vai trò như những người vận chuyển, đưa những dưỡng chất quan trọng như Canxi cùng các vitamin, phospho tham gia vào cơ thể trong quá trình tạo xương.

Chi định:

- Người có nhu cầu bổ sung canxi, trẻ đang độ tuổi trưởng, trẻ coi xương, tăng chiều cao, hư hỏng răng và đặc biệt thanh thiếu niên từ 10 tuổi trở lên nhất là giai đoạn dậy thì.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.
- Người đang治疗 hụt calci, thoái hóa đốt sống cổ, đột sống lưng, đau thần kinh, và/hoặc đốt sống đùi, xương vòi cắn người cao tuổi.
- Đóng cho người bị loãng xương, đau nhức xương, gãy xương và/hoặc phục sức gãy xương.
- Đóng phòng ngừa trường hợp xơ vữa động mạch, người có mờ mắt cao, đau nửa đầu, Alzheimer.
- Bệnh nhân đang điều trị tuyến giáp, hóa trị U giáp, dùng phot phax A1-131.

Chỉ dùng theo toa, hoặc theo tư vấn thầy thuốc.

Chống chỉ định:

Không chỉ định với tình trạng dị ứng, một trong các thành phần của thuốc.

Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, người sói tiết niệu.

Liều lượng:

Bệnh nặng (Liều tần cảng 01 tháng) dùng 3-6 viên/ 24h, duy trì 2 viên/24h dùng trong 02 tháng 1 đợt trị liệu.

Bệnh nhẹ dùng 1-3 viên/24h (dùng ít nhất 01 đến 02 tháng trở nên 1 đợt trị liệu).

Liều phòng ngừa bao vây, dùng 1 viên/24h ít nhất trong 01 tháng. Trẻ em dùng bằng nửa liều của người lớn.

Uống thuốc sau khi ăn.

Hướng dẫn bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, hoặc để ngăn mát tủ lạnh.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất, hoặc xem trên bao bì sản phẩm.

Quy cách bao gói: Hộp 30 viên x 773mg/ viên x 15 viên/ vỉ x 2 vỉ hộp.

Chất liệu bao bì đóng gói: Viên được ép vỉ Alu/PVC.

Xuất xứ: Bồ Đào Nha

Sản xuất tại: Lecifarma-Laboratorio Farmaceutico Lda

Địa chỉ: Varzea do Andadre Cabeço de Montachique 2670-741 Lousa Loures-Portugal.