

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế




**SANDOZ**

# ACTOBIM

*L. acidophilus, B. infantis, E. faecium*

Cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột



6/12/2011  
KTV

- **Chứa 3 chủng vi khuẩn đường tiêu hóa sinh acid lactic<sup>(\*)</sup>**
- **Thích hợp với mọi lứa tuổi (trẻ sơ sinh, trẻ em & người lớn)<sup>(\*)</sup>**

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

# ACTOBIM®

*L. acidophilus, B. infantis, E. faecium*



## Cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

#### Thành phần

**Hoạt chất:** Mỗi viên actobim chứa ít nhất  $1,2 \times 10^7$  đơn vị khuỷn lạc sinh acid lactic, trong đó: *Lactobacillus acidophilus* (sp. *L.gasseri*)  $\geq 4,5 \times 10^6$ , *Bifidobacterium infantis*  $\geq 3 \times 10^6$ , *Enterococcus faecium*  $\geq 4,5 \times 10^6$ .

**Tá dược:** magnesi stearat, lactose, dextrin, tinh bột nghệ, gelatin, methyl parahydroxybenzoat (E218) và propyl parahydroxybenzoat (E216), titanium dioxide (E171).

#### Đóng gói

Viên nang cứng màu trắng đục, bên trong chứa bột màu trắng không mùi.

Hộp 2 vỉ x 8 viên.

#### Chỉ định

Viên nang Actobim chứa 3 chủng vi khuẩn đóng khố sinh acid lactic là thành phần sẵn có của hệ vi khuẩn đường ruột tham gia vào việc tiêu hóa, tổng hợp các vitamin và ức chế sự sinh sản của các vi khuẩn có hại.

Khi thiếu hụt lượng vi khuẩn sinh acid lactic, môi trường trở nên kiềm hơn, ức chế các hoạt động tiêu hóa của các enzyme dẫn đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn có hại. Khi cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ, dẫn tới một số rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, đầy hơi).

Viên nang Actobim dùng để phòng và hỗ trợ trong điều trị tiêu chảy, đầy hơi và các rối loạn tiêu hóa khác do:

- Nhiễm vi khuẩn và virus đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.
- Điều trị bằng hóa chất và kháng sinh phổ rộng.
- Chiếu xạ vùng bụng và xương chậu.

#### Liều lượng và cách dùng


Dùng theo chỉ định của bác sĩ. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến được sĩ hoặc bác sĩ.

- Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi: 1 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Điều trị tiêu chảy cho trẻ nhỏ hơn 6 tuổi phải có sự giám sát của bác sĩ.

Dùng Actobim sau bữa ăn với lượng nước vừa đủ.

**VỚI NHỮNG TRẺ EM KHÔNG NUỐT ĐƯỢC VIÊN THUỐC, CÓ THỂ MỞ NANG THUỐC, CHO BỘT THUỐC (KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ) VÀO THÌA VÀ HÒA VỚI MỘT ÍT CHẤT LỎNG.**



(\*) Thông tin kê toa

#### Mọi thông tin xin liên hệ:

**TP.HCM:** Lầu 10, Tòa nhà Centec  
72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 Tel: 3823 9090 - Fax: 3823 9595

**Hà Nội:** P602, Lầu 6, Tòa nhà Harec  
4A Láng Hạ, Q. Ba Đình Tel: 3772 7390 - Fax: 3514 7372



VN-10368-10

#### Nhà sản xuất:

LEK PHARMACEUTICALS D.D.  
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

**Nhà phân phối:**  
VIMEDIMEX  
246 Cống Quỳnh, Q.1, TP. HCM