


1149/1149

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09/3/2014

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

MẪU GÓI







TP.HCM, ngày 10... tháng 06... năm 2013

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
D.S. Đỗ Vũ Quý

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM






MẪU HỘP



Tp.HCM, ngày 10... tháng 06... năm 2013
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY LIÊN DOANH
DƯỢC PHẨM
MEBIPHAR
AUSTRAPHARM
Q.TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH
DS. Đỗ Vũ Trí


CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

MẪU HỘP



Tp.HCM, ngày 10... tháng 06... năm 2013

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY LIÊN DOANH
DƯỢC PHẨM
MEBIPHAR
AUSTRAPHARM
Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH
DS. Đỗ Vũ Trí



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ANDONBIO

Gói 1 g

Công thức:

Lactobacillus acidophilus.....75 mg
(Ứng với vi sinh sống..... 10^8 CFU)

Tà được vừa đủ 1 gói: Maltodextrin, Lactose anhydrous, Fructo-Oligosaccharid (FOS), Acid ascorbic, Silica colloidal anhydrous, Bột hương cam.

Dạng bào chế: Thuốc bột uống.

Chỉ định:

Điều trị phụ trong ia chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.

Thay thế vi khuẩn chỉ bị mất do dùng kháng sinh.

Liều dùng và cách dùng:

Cách dùng: Thuốc thường được uống với sữa, nước quả hoặc nước đun sôi để nguội.

Liều dùng: 1 gói /lần, ngày uống 3-4 lần.

Cần chú ý: Thuốc này chỉ là 1 thủ yếu trong điều trị ia chảy chưa có biến chứng máu nước và điện giải. Trước khi dùng bất cứ dạng thuốc nào, cần phải đánh giá đúng tình trạng máu nước và điện giải của người bệnh.

Chống chỉ định:

Không dùng cho người sốt cao trừ khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Chế phẩm này có chứa lastose, không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh, hoặc thiếu lactase.

Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:

Nếu sau 2 ngày điều trị mà vẫn bị tiêu chảy, cần khám lại.

Cần giám sát theo dõi khi dùng chế phẩm chứa Lactobacillus acidophilus cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi.

Tương tác thuốc, các dạng tương tác khác:

Chưa có tài liệu nêu ra tương tác thuốc

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai: Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít.

Tốt nhất là không dùng khi mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Không chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Khi bắt đầu dùng thuốc có hiện tượng sinh hơi trong ruột, nhưng hiện tượng này giảm dần trong quá trình điều trị. Nhiễm acid chuyển hóa đã xảy ra khi dùng viên nén, đôi khi táo bón.

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo về các trường hợp sử dụng quá liều ANDONBIO.

Thông báo cho thấy thuốc những tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.

Đóng gói: gói 1g, hộp 25 gói, hộp 50 gói.

Bảo quản: giữ trong bao bì kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Cơ sở.

Đề xá tâm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

[Signature]

CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Phó Giám đốc,

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thành



ĐS. Đỗ Văn Tài