

Viên đặt âm đạo

# GINCLOR



- Kiểm soát tình trạng ngứa, khô rát và nấm âm đạo
- Phục hồi hệ vi khuẩn và độ pH của âm đạo
- Phòng ngừa và kiểm soát bệnh nấm Candida

Medical Device CE



SẢN XUẤT TẠI: ITALY

## TÀI LẬP CÂN BẰNG HỆ VI KHUẨN VÀ pH ÂM ĐẠO

### MÔ TẢ

Viên đặt âm đạo GINCLOR là một thiết bị y tế có thành phần từ axit hyaluronic, axit lactic, Axit Boric, Vitamin E, dầu cây trà, Chlorhexidine, chất béo trung tính bão hòa hợp, axit glycyrrhetic 18-beta. Axit hyaluronic ở dạng muối natri với liều lượng 20 mg/viên có tác dụng dưỡng ẩm và bảo vệ chống khô âm đạo, góp phần khôi phục môi trường âm đạo tự nhiên và thoải mái. Axit Lactic thường có trong âm đạo hỗ trợ điều chỉnh độ pH ngày lập tức và tạo điều kiện phục hồi tự nhiên của hệ sinh thái âm đạo. Axit boric, nhờ tồn tại trong môi trường âm đạo, giúp cân bằng pH âm đạo.

### CHỈ ĐỊNH

Viên đặt âm đạo GINCLOR là một thiết bị y tế giúp khôi phục nhanh chóng môi trường âm đạo và hữu ích trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm trung Candida tái phát. Chứa axit hyaluronic, axit boric và axit lactic, giúp xoa dịu các triệu chứng do quá trình hydrat hóa âm đạo không cân bằng và / hoặc pH âm đạo.

### LIỀU DÙNG

Đặt mỗi ngày một viên - tốt nhất là vào buổi tối trước khi ngủ - trong 5-7 ngày sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt hoặc theo lời khuyến cáo của bác sĩ.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Rửa vùng âm đạo đúng cách trước khi sử dụng (tốt nhất là rửa âm đạo bên ngoài và bên trong);
- Rửa tay cẩn thận trước khi mở vỏ lấy viên đặt;
- Nhẹ nhàng đưa viên đặt vào sâu trong âm đạo, tốt nhất ở tư thế nằm ngửa.

### Điều kiện bảo quản

Bản quyền bao bì đã đóng gói đúng cách ở nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh ánh nắng và nguồn nhiệt.

### Tác dụng phụ

Có thể nếu quá mẫn với bất kỳ thành phần nào.

### Cảnh báo

Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em. Không nuốt. Không sử dụng nếu gói đã được mở trước đó hoặc bị hỏng. Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng. Hạn sử dụng đã cấp đến sản phẩm chưa được mở và bảo quản đúng cách. Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp có tổn thương và / hoặc thương hàn thường xuyên. Không sử dụng đồng thời với các liệu pháp khác, với thuốc hoặc với thiết bị y tế, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ. Không sử dụng sản phẩm trong thời kỳ kinh nguyệt. Không vượt quá liều lượng để xuất hiện các phản ứng không mong muốn. Không co lõi khuyên ý tế. Việc sử dụng - đặc biệt nếu kéo dài - có thể dẫn đến các hiện tượng như cảm. Nếu dùng như vậy, hãy ngừng điều trị và hỏi ý kiến bác sĩ để bắt đầu một liệu pháp phù hợp. Điều quan trọng là phải thông báo cho bác sĩ hoặc được bác sĩ về bất kỳ tác dụng không mong muốn nào không được báo cáo trong tờ hướng dẫn.

### Lưu ý khi sử dụng

Trong trường hợp mang thai cần nguyên vẹn, trước khi sử dụng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa về điều kiện sử dụng cụ thể. Sản phẩm dùng một lần, không sử dụng lại nếu bị rơi ra ngoài.

### Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 5 viên.

