

279/163

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Nhãn lọ

CÔNG DỤNG: Bổ thận, giảm đau, làm liền xương.

CHỈ ĐỊNH:

- Thận hư, thất lưng đau, ù tai, tai điếc, đau răng.
- Đau do sang chấn, bong gân, gãy xương, rạn xương, sưng cơ, tụ máu.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống sau khi ăn

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYTTP HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 02203.853848 * Fax: 02203.853848

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Lọ 60 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim
Cao khô Cốt toái bổ 7:1 280mg
(*Extractum Rhizoma Drynariae siccus*) (tương đương 1,96g thân rễ Cốt toái bổ (*Rhizoma Drynariae*))

Tá dược: vừa đủ 1 viên

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Đạt TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

2. Nhãn hộp

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim
Cao khô Cốt toái bổ 7:1 280mg
(*Extractum Rhizoma Drynariae siccus*) (tương đương 1,96g thân rễ Cốt toái bổ (*Rhizoma Drynariae*))

Tá dược: vừa đủ 1 viên

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Đạt TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Hộp 1 lọ 60 viên

CÔNG DỤNG: Bổ thận, giảm đau, làm liền xương.

CHỈ ĐỊNH:

- Thận hư, thất lưng đau, ù tai, tai điếc, đau răng.
- Đau do sang chấn, bong gân, gãy xương, rạn xương, sưng cơ, tụ máu.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống sau khi ăn

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 08/10/2018.

Rx Thuốc kê đơn

LICOTAN

Rx Thuốc kê đơn

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Hộp 1 lọ 60 viên

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYTTP HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 02203.853848 * Fax: 02203.853848

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Nhãn lọ

CÔNG DỤNG: Bổ thận, giảm đau, làm liền xương.
CHỈ ĐỊNH:

- Thận hư, thất lưng đau, ù tai, tai điếc, đau răng.
- Đau do sang chấn, bong gân, gãy xương, rạn xương, sưng cơ, tụ máu.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống sau khi ăn

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
2 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYT T HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 02203.853848 * Fax: 02203.853848

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Lọ
80 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim
Cao khô Cốt toái bổ 7:1 280mg
(*Extractum Rhizoma Drynariae siccus*) (tương đương
1,96g thân rễ Cốt toái bổ (*Rhizoma Drynariae*))

Tá dược: vừa đủ 1 viên

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá
30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Đạt TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SBK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

2. Nhãn hộp

★ LICOTAN ★ LICOTAN ★ LICOTAN ★

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim
Cao khô Cốt toái bổ 7:1 280mg
(*Extractum Rhizoma Drynariae siccus*) (tương đương
1,96g thân rễ Cốt toái bổ (*Rhizoma Drynariae*))

Tá dược: vừa đủ 1 viên

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá
30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Đạt TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SBK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Rx Thuốc kê đơn

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Hộp 1 lọ
80 viên

CÔNG DỤNG: Bổ thận, giảm đau, làm liền xương.
CHỈ ĐỊNH:

- Thận hư, thất lưng đau, ù tai, tai điếc, đau răng.
- Đau do sang chấn, bong gân, gãy xương, rạn xương, sưng cơ, tụ máu.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống sau khi ăn

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
2 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYT T HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 02203.853848 * Fax: 02203.853848

Rx Thuốc kê đơn

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Hộp 1 lọ
80 viên

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Nhãn lọ

CÔNG DỤNG: Bổ thận, giảm đau, làm liền xương.

CHỈ ĐỊNH:

- Thận hư, thất lưng đau, ù tai, tai điếc, đau răng.
- Đau do sang chấn, bong gân, gãy xương, rạn xương, sưng cơ, tụ máu.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống sau khi ăn

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
2 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYTTP HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 02203.853848 * Fax: 02203.853848

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Lọ 100 viên

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim
Cao khô Cốt toái bổ 7:1 280mg
(*Extractum Rhizoma Drynariae siccus*) (tương đương 1,96g thân rễ Cốt toái bổ (*Rhizoma Drynariae*))

Tá dược: vừa đủ 1 viên

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Đạt TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

2. Nhãn hộp

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim
Cao khô Cốt toái bổ 7:1 280mg
(*Extractum Rhizoma Drynariae siccus*) (tương đương 1,96g thân rễ Cốt toái bổ (*Rhizoma Drynariae*))

Tá dược: vừa đủ 1 viên

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Đạt TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

LICOTAN

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Hộp 1 lọ 100 viên

CÔNG DỤNG: Bổ thận, giảm đau, làm liền xương.

CHỈ ĐỊNH:

- Thận hư, thất lưng đau, ù tai, tai điếc, đau răng.
- Đau do sang chấn, bong gân, gãy xương, rạn xương, sưng cơ, tụ máu.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống sau khi ăn

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
2 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn

**BỔ THẬN
GIẢM ĐAU
LÀM LIỀN XƯƠNG**

Hộp 1 lọ 100 viên





Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VYTTP HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 02203.853848 * Fax: 02203.853848

Rx Thuốc kê đơn

LICOTAN

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Nhãn hộp



2. Nhãn vỉ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: ^{Rx}LICOTAN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

1. Thành phần công thức thuốc:

Thành phần hoạt chất:	Hàm lượng
Cao khô Cốt toái bồ 7:1 (<i>Extractum Rhizoma Drynariae siccus</i>) (tương đương 1,96g thân rễ Cốt toái bồ (<i>Rhizoma Drynariae</i>))	280 mg
Thành phần tá dược: Avicel PH101, Tinh bột ngô, Natri croscarmellose, Polyvinyl pyrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Polyethylen glycol 6000, Hydroxypropyl methyl cellulose 606, Hydroxypropyl methyl cellulose 615, Titan dioxyd, Oxyd sắt, Nipagin, Nipasol.	Vừa đủ 1 viên

2. Dạng bào chế:

Viên nén bao phim màu nâu, nhãn bóng, vị đắng.

3. Chỉ định: Điều trị

- Thận hư, thất lưng đau, ù tai, tai điếc, đau răng.
- Đau do sang chấn, bong gân, gãy xương, rạn xương, sung cơ, tụ máu.

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

4.2. Cách dùng:

Uống sau khi ăn

5. Chống chỉ định:

Không dùng cho người âm hư, huyết hư không có huyết ứ: người suy nhược, thiếu máu xanh xao, nóng trong người.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Chưa có báo cáo

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:



Handwritten signature in blue ink.

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc hay lái tàu xe.

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc:

Tương tác thuốc: Chưa có báo báo.

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

11.2. Xử trí:

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 lọ 80 viên, hộp 1 lọ 100 viên, hộp 1 lọ 120 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 02203.853.848

Fax: 02203.853.848