

BO Y TE
CUC QUAN LY DUOC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/...3.../2016

VD-24068-16/153

NỘI DUNG MẪU HỘP HOÀN LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG-HỘP 1 VÍ X 10 HOÀN

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
Tel: 04.36910724 - 0321.3791016 - Fax: 0321.39981790
Tư vấn khách hàng: 18006612



Traphaco® Hạին Lục vị địa hoàng



Hộp 1 vỉ x 10 hoàn mềm

THÀNH PHẦN:

Thực địa:.....1,15g Phục linh.....0,71g
Hoài sơn.....0,96g Trạch tả.....0,71g
Sơn thù.....0,96g Tà dược(Mật ong)..
Màu đơn bì.....0,71g Vđ.....1 viên

CÔNG DỤNG:
Tư âm bổ thận. Dùng trong trường hợp thận âm suy tổn, thần hình gây yếu, chóng mặt u tai, lưng gối mềm yếu, cột sống, di tinh, mồ hôi trộm, người khó ngủ.

LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG

Traphaco®

Traphaco® Hạին Lục vị địa hoàng



Hộp 1 vỉ x 10 hoàn mềm

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: Ngày dùng 2 lần, mỗi lần một viên hoàn.
CHONG CHỈ ĐÌNH, THẬN TRỌNG, THÔNG TIN KHÁC: Xin xem toa hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ NGOÀI TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



Kích thước 71mm x 172mm

Tỷ lệ: 80%

Số lô SX: HD:

Toa hướng dẫn sử dụng thuốc

Hoàn LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG



Trình bày: Hộp 10 viên hoàn mềm x 10 gam

Công thức cho 1 viên hoàn:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1,15 g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	0,96 g
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	0,96 g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae Suffruticosae</i>)	0,71 g
Phục linh (<i>Poria</i>)	0,71 g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,71 g
Tá dược (mật ong)vd....	1 viên

* **Chỉ định điều trị :**

Tư âm bổ thận. Dùng trong trường hợp thận âm suy tổn, thân hình gầy yếu, chóng mặt ù tai, lưng gối mềm yếu, cốt chùng, di tinh, mồ hôi trộm, người khô hạo.

* **Liều dùng – cách dùng :** Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 hoàn

* **Sử dụng quá liều:** Tuy thuốc không độc, nhưng không được sử dụng quá liều chỉ định.

* **Chống chỉ định:** Người thể hàn, tỳ vị hư hàn

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

* **Tác dụng phụ:** Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên

Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý

* **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc :** Có thể dùng được thuốc khi đang lái xe và vận hành máy móc.

* **Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác :** Chưa phát hiện tương tác của thuốc với các thuốc khác.

* **Thận trọng:** Không nên dùng trong các trường hợp sau:

- Ăn không tiêu
- Đại tiện lỏng do hư hàn
- Cảm sốt
- Phụ nữ có thai
- Người đái tháo đường

* **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng

* **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* **Tiêu chuẩn:** TCCS



TUẦN CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tân Quang- Văn Lâm- Hưng Yên

Tel: 0321.3791016 - FAX: 0321.3991790