

# NONZOLI

Isotretinoin 20mg Soft capsules, 20mg

## THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Isotretinoin.....20mg

Tá dược vừa đủ 1 viên.

## DẠNG BẢO CHẾ

Viên nang mềm

## CHỈ ĐỊNH

Điều trị thể trứng cá nặng: trứng cá viêm (u hay nốt) và trứng cá mụn bọc (trang bọc) không đáp ứng với các trị liệu khác (dùng kháng sinh kết hợp với thuốc bôi tại chỗ)

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Dùng thuốc trong bữa ăn, 1-2 lần/ngày.

**Đối với người lớn, thanh niên, người trẻ tuổi:** 0,5 đến 1mg/kg/ngày. Thông thường, liều điều trị khởi đầu là 0,5mg/kg/ngày, sau vài tuần có thể thay đổi liều dùng, tùy theo độ dung nạp thuốc. Thời gian điều trị thường từ 4-6 tháng. Để tránh tái phát, liều lượng tích lũy cần phải dùng cho mỗi đợt điều trị là 120-150mg/kg. Những tổn thương da sẽ tiếp tục thuyên giảm ngay cả sau khi ngưng điều trị.

**Trẻ em:** Isotretinoin không được chỉ định điều trị mụn trứng cá trước tuổi dậy thì và không khuyến cáo sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

**Bệnh nhân suy thận:** nên bắt đầu điều trị với liều thấp hơn (10mg/ngày). Sau đó, liều tăng dần lên đến 1mg/kg/ngày hoặc lên đến liều tối đa mà bệnh nhân dung nạp được.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Phụ nữ có thai và cho con bú, hoặc có dự định sinh con, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mà không áp dụng các biện pháp tránh thai  
Bệnh nhân suy gan  
Bệnh nhân tăng lipid máu quá cao

Thừa Vitamin A

Quá mẫn với vitamin A

Đi ứng với Isotretinoin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc

Phối hợp với kháng sinh thuộc nhóm Tetracyclin.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tác dụng gây dị dạng ở thai nhi. Trên da: Khô da, khô môi, bong tróc tại chỗ, ngứa, phát ban. Trên hệ cơ xương: đau khớp, đau cơ, đau lưng. Trên hệ tâm thần: trầm cảm, lo lắng, thay đổi tính khí. Trên hệ thần kinh: Đau đầu. Hệ hô hấp: Chảy máu cam, khô mũi, viêm mũi họng. Hệ tiêu hóa: viêm kết tràng, viêm hồi tràng, chảy máu tiêu hóa, viêm ruột, viêm tụy. Trên gan-mật: Tăng transaminase. Trên mắt: Viêm mi mắt, viêm màng kết, khô mắt, kích ứng mắt. Hệ tiết niệu: Viêm tiểu cầu thận. Tác dụng không mong muốn khác: Tăng Triglyceride, HDL, Cholesterol máu, tăng glucose máu, chứng huyết niệu, protein niệu.

## TƯƠNG TÁC THUỐC

Không dùng kết hợp Isotretinoin với các kháng sinh nhóm Tetracycline (dùng đường toàn thân) vì nguy cơ tăng áp lực trong sọ.

## BẢO QUẢN:

Bảo quản trong bao bì kín, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

## TIÊU CHUẨN:

Nhà sản xuất  
**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để thuốc xa tầm tay trẻ em.*

## Nhà sản xuất:

**KOREAN DRUG CO., LTD.**  
69-10, Wonjeok-ro, Sindun-myein, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea, Hàn Quốc.

Rx Thuốc bán theo đơn

Tại hiệu lực hành sự bộ

# NONZOLI

Isotretinoin 20mg Soft capsules, 20mg



SDK: VN-19029-15

**GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG  
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ NẶNG**