

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### CONSTITPASS MACROGOL 13,3 g SACHETS

Hữu ích trong trường hợp táo bón

#### 1. Nhận dạng, thành phần và mục đích của thiết bị y tế

CONSTITPASS là một sản phẩm y tế bổ trợ nhuận tràng, thông qua hành động thẩm thấu, điều hòa ruột một cách tự nhiên. Nó không được hấp thụ hoặc lên men trong ruột, không gây kích ứng niêm mạc và được loại bỏ trong phân ở dạng chưa biến đổi.

CONSTITPASS được chỉ định đặc biệt trong trường hợp táo bón mãn tính và thỉnh thoảng đi tiêu không đều. Trong thực tế, nhờ ái lực của nó với nước, CONSTITPASS làm mềm phân tạo điều kiện cho việc thải loại ra mà không gây ra co rút hoặc đau bụng, hoặc tình trạng khẩn cấp.

Hiệu quả của nó không bị giảm theo thời gian, được chứng minh an toàn khi sử dụng nhiều lần và lâu dài.

#### 1. 1 Thành phần

Mỗi gói đôi chứa 13.125 g Macrogol 3350, gồm 2 gói đơn chứa: 6.65g Macrogol 3350

Tá dược: Silicon dioxide, hương vị, natri saccharin

#### 2. Đóng gói:

CONSTITPASS là một loại bột pha hỗn dịch để uống

Hộp chứa 10 gói đôi chia hết 13,3 g hay 20 gói đơn 6.65g

#### 3. Liều dùng và phương pháp sử dụng

**Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:** 20-30g/ ngày, tương đương với 4-6 gói/ ngày

**Trẻ từ 2-11 tuổi:** 1-1.5g/kg cân nặng/ngày, tương đương từ 2- 4 gói/ ngày, từ 3-6 ngày. Liều điều trị duy trì: 0.5-1g/kg cân nặng/ ngày cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn.

**Trẻ em dưới 2 tuổi cần tư vấn của bác sĩ.**

(Khuyến nghị: từ 6 tháng- 2 tuổi: 0.8g/kg cân nặng/ ngày, tương đương với 1-2 gói/ ngày.)

Xé túi dọc theo vạch chỉ "một nửa liều" và pha loãng lượng chứa trong 62,5 ml nước (khoảng một nửa ly nước).

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

**Không dùng CONSTITPASS trong trường hợp:**

- Hẹp ruột
- Thủng ruột
- Bệnh viêm ruột (ví dụ như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng)

**Không dùng trong trường hợp tắc ruột.**

Phụ nữ có trong khi mang thai và cho con bú chỉ sử dụng CONSTITPASS khi thực sự cần thiết, theo lời khuyên y tế.

Ở bệnh nhân suy thận là không cần thiết để điều chỉnh liều. Thời gian điều trị bằng CONSTITPASS không quá 2 tuần. Trong trường hợp cần điều trị có thể được lặp đi lặp lại. Sử dụng kéo dài có thể cần thiết trong trường hợp khó chịu và / hoặc táo bón mãn tính. Táo bón như vậy có thể được gây ra bởi thuốc giảm đau (opioids) và để điều trị bệnh Parkinson (thuốc kháng cholinergic), hoặc xuất hiện trong trường hợp bệnh như bệnh đa xơ cứng hoặc bệnh Parkinson có thể gây biến chứng khó chữa.

thể xuất hiện (đặc biệt là vào lúc bắt đầu). Hiếm khi, phản ứng quá mẫn (vội vàng, nổi mề đay) có thể xảy ra.

Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trong trường hợp khởi phát bất kỳ phản ứng bất lợi nào, thậm chí khác với những gì được liệt kê. Nếu các triệu chứng vẫn còn, tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

Nếu quên uống, dừng dùng liều gấp đôi, hãy đợi và uống liều tiếp theo.

## 5. Quá liều

Trong trường hợp quá liều, các tác dụng sau đây có thể xảy ra: đau dữ dội, trướng bụng, tiêu chảy và nôn mửa có thể gây mất cân bằng điện giải. Nếu phản ứng bất lợi xảy ra, liên hệ ngay với bác sĩ của bạn.

## 6. Tương tác với thuốc

Cho đến nay không có những tương tác đã biết với thuốc, tuy nhiên nên uống sau ít nhất 2 giờ kể từ khi dùng thuốc uống khác hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác (thuốc vi lượng đồng căn) hoặc thực phẩm bổ sung để khả năng thẩm thấu của Macrogol và gia tăng tốc độ vận chuyển qua đường tiêu hoá.

Tuy nhiên, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng CONSTIPASS trong trường hợp các liệu pháp khác đang diễn ra.

## 7. Bảo quản:

Giữ CONSTIPASS ở nơi khô ráo và tránh xa nguồn nhiệt hoặc ánh sáng trực tiếp; chỉ mở gói khi sử dụng. Không sử dụng trong trường hợp gói bị hư hỏng. Để xa tầm tay trẻ em.

Giữ sản phẩm ở điều kiện dưới 25 ° C.

## 8. Cảnh báo và phòng ngừa

Trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú chỉ nên sử dụng CONSTIPASS sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nên vượt quá số lượng được đề xuất, vì liều cao hơn có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Không sử dụng sản phẩm trong hơn 30 ngày liên tiếp. Nếu các triệu chứng kéo dài hơn 30 ngày liên tục, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không dùng trong trường hợp không dung nạp với sản phẩm.

Không dùng trường hợp quá mẫn đã biết với các thành phần và polyethylen glycol.

Mỗi gói là dùng một lần và chỉ nên được mở tại thời điểm dùng.

**Nhà sản xuất: SIIT S.R.L**

Qua Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Ý

**Marketing company:**

**İLKO İlaç San. ve Tic. As**

Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok.

Số: 10 34885 Sancaktepe - İstanbul / Thổ Nhĩ Kỳ

**Công ty nhập khẩu và phân phối tại Việt nam:**

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG**

**Địa chỉ: LK 03-07, KĐT An Hưng, P. Dương Nội, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội**

**SĐT: 024.625.41100, Hotline: 096.913.8181**

**Website: trikhangpharma.com**