

# MANGOHERPIN 2%

Thuốc dùng ngoài

## **I/PHÂN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN**

### **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

### **ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**

**THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.**

**THÀNH PHẦN:** Cho 1 tuýp các loại

5g	10g
- Mangiferin	100 mg 200 mg

- Các tá dược gồm: Lanette E, nipagin, nipasol, cetiol CC, emulgad CM và cosmedia SPL vừa đủ.

**MÔ TẢ SẢN PHẨM:** Thuốc được sản xuất ở dạng kem (kem láng mịn, đồng nhất, màu vàng nhạt, không mùi, không có vật thể lạ, không cứng lại hoặc tách lớp ở điều kiện thường, không được chảy lỏng ở nhiệt độ 37°C.

**QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 tuýp nhựa 5 g hoặc 10 g.

### **THUỐC NÀY DÙNG CHO BỆNH GÌ?**

Thuốc này được dùng để:

Điều trị các dạng bệnh cấp tính và tái phát do virus herpes gây ra bao gồm: Herpes simplex, Herpes zoster (bệnh Zona); bệnh thủy đậu và eczema caposi.

### **NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?**

- Kem Mangoherpin 2% được dùng bôi ngoài da cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi.

- Rửa sạch nơi viêm nhiễm, lau khô, bôi thuốc 3-4 lần trong ngày.

Tác dụng chữa bệnh thể hiện rõ hơn trong những giai đoạn đầu hay tiến triển của bệnh. Thời gian dùng phụ thuộc vào tính chất cụ thể của các bệnh.

Trong bệnh Herpes simplex, bệnh Zona các dạng cấp tính và tái phát thuốc được dùng bôi lên ngay khi phát hiện những tổn thương đầu tiên trong 3-5 ngày. Trong trường hợp tổn thương lan rộng cũng như kèm theo sốt, nổi hạch và những triệu chứng khác của bệnh, nên sử dụng kết hợp đồng thời cả dạng viên uống và dạng kem dùng ngoài trong 5-14 ngày. Trong các bệnh varicella (thủy đậu) và eczema caposi dùng điều trị phối hợp dạng viên uống và dạng kem bôi ngoài da từ 7-21 ngày.

### **KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?**

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

### **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:**

Thuốc có thể làm tăng sự nhạy cảm của da với các bức xạ cực tím ở mức độ nhẹ.

### **NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?**

Không có báo cáo về tương tác thuốc.

### **CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?**

Nếu quên một lần không dùng thuốc thì dùng bù ngay một liều thuốc khi bạn nhớ ra. Các liều thuốc còn lại nên dùng cho đúng giờ.

### **CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?**

Thuốc này cần được bảo quản nơi nhiệt độ không quá 30°C, không được để lạnh.

### **NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU.**

Không có báo cáo về sử dụng quá liều.

### **CẦN LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO?**

Thuốc dùng ngoài da ít có khả năng bị quá liều. Nếu dùng quá liều thì báo cáo với bác sĩ của bạn để được hướng dẫn xử trí thích hợp.

### **NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY**

- Không được bôi thuốc vào mắt.

- Không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai.

- Do tiềm năng có hại cho trẻ nhỏ đang bú mẹ chưa được biết rõ, tốt nhất

không dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

- Thuốc không gây ảnh hưởng gì cho người lái xe hoặc vận hành máy móc.

### **KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ?**

Khi bạn có điều chi thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, đừng ngần ngại hỏi ngay ý kiến của bác sĩ.

### **NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ.**

**HẠN DÙNG CỦA THUỐC:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:** 27/03/2018.

**NGÀY CẬP NHẬT:** 08/03/2019 THEO CVS SỐ 2763/QLD-ĐK.

## **II/ PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁN BỘ Y TẾ**

**DƯỢC LỰC HỌC:** Mã ATC: Không có, Nhóm thuốc: Thuốc chống virus.

MANGOHERPIN 2 % là thuốc dạng kem bôi ngoài da có chứa hoạt chất mangiferin được chiết xuất từ lá cây xoài *Mangifera indica* L. *Anacardiaceae*. Mangiferin là chất có tính kháng virus đã được chứng minh lâm sàng trong điều trị các loại virus như virus gây bệnh herpes, varicella zoster... Tác dụng của mangiferin dựa trên sự kìm hãm quá trình sinh sản của virus đặc biệt hiệu quả trong thời kỳ đầu phát triển của bệnh.

### **CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:**

Điều trị các dạng bệnh cấp tính và tái phát do virus herpes gây ra bao gồm: Herpes simplex, Herpes zoster (bệnh Zona); bệnh thủy đậu và eczema caposi.

### **LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:**

- Kem Mangoherpin 2% được dùng bôi ngoài da cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi.

- Rửa sạch nơi viêm nhiễm, lau khô, bôi thuốc 3-4 lần trong ngày.

Tác dụng chữa bệnh thể hiện rõ hơn trong những giai đoạn đầu hay tiến triển của bệnh. Thời gian dùng phụ thuộc vào tính chất cụ thể của các bệnh.

Trong bệnh Herpes simplex, bệnh Zona các dạng cấp tính và tái phát thuốc được dùng bôi lên ngay khi phát hiện những tổn thương đầu tiên trong 3-5 ngày. Trong trường hợp tổn thương lan rộng cũng như kèm theo sốt, nổi hạch và những triệu chứng khác của bệnh, nên sử dụng kết hợp đồng thời cả dạng viên uống và dạng kem dùng ngoài trong 5-14 ngày. Trong các bệnh varicella (thủy đậu) và eczema caposi dùng điều trị phối hợp dạng viên uống và dạng kem bôi ngoài da từ 7-21 ngày.

### **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:** Không được bôi thuốc vào mắt.

### **TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

- Do tiềm năng có hại cho trẻ nhỏ đang bú mẹ chưa được biết rõ, tốt nhất không dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

### **TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Thuốc không gây ảnh hưởng gì cho người lái xe hoặc vận hành máy móc.

### **TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:**

Không có báo cáo.

### **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Thuốc có thể làm tăng sự nhạy cảm của da với các bức xạ cực tím ở mức độ nhẹ.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Không có báo cáo.

## **WHO-GMP**

TOA MANGOHERPIN 2% 19-H

**BRV**  
Healthcare

Nhà sản xuất:

**CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE**

**Địa chỉ:** Khu A, số 18, Đường số 09, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.