

5118/1815
377/1815



THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Bạch truat.....	40mg
Bột Mộc hương.....	30mg
Bột Sa nhân.....	30mg
Bột Bán hạ.....	25mg
Bột Bạch linh.....	25 mg
Bột Cam thảo.....	25mg
Bột Trần bì.....	25mg
Cao đặc Đảng sâm.....	40mg
(tương đương với 133mg dược liệu)	
Tả dược.....	vd 1 viên



Lọ 230 viên hoàn cứng

hương Sa PH



CHỈ ĐỊNH:
Kien ty, ich khi. Chua chung dau bung, day hoi, gay day tuc o thuong vi, o hoi, non mua, ia chay, kho tieu, kiet ly, viem dai trang cap va man tinh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:

- Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 15 - 20 viên, uống sau bữa ăn.
- Đợt điều trị 4-6 tuần, có thể dùng 2-3 đợt.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Bạch truat.....	40mg
Bột Mộc hương.....	30mg
Bột Sa nhân.....	30mg
Bột Bán hạ.....	25mg
Bột Bạch linh.....	25 mg
Bột Cam thảo.....	25mg
Bột Trần bì.....	25mg
Cao đặc Đảng sâm.....	40mg
(tương đương với 133mg dược liệu)	
Tả dược.....	vd 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Kien ty, ich khi. Chua chung dau bung, day hoi, gay day tuc o thuong vi, o hoi, non mua, ia chay, kho tieu, kiet ly, viem dai trang cap va man tinh.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:

- Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 15 - 20 viên, uống sau bữa ăn.
- Đợt điều trị 4-6 tuần, có thể dùng 2-3 đợt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Hộp 1 lọ x 230 viên hoàn cứng

hương Sa PH

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

Hộp 1 lọ x 230 viên hoàn cứng

hương Sa PH

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 05/09/2011

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HƯƠNG SA P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Bột Bạch truật (<i>Pulveres rhizomae atractylodis macrocephalae</i>)	: 40mg
Bột Mộc hương (<i>Pulveres radices saussureae lappae</i>)	: 30mg
Bột Sa nhân (<i>Pulveres fructi amomi</i>)	: 30mg
Bột Bán hạ (<i>Pulveres rhizomae typhonii trilobati</i>)	: 25mg
Bột Bạch linh (<i>Pulveres poriae</i>)	: 25mg
Bột Cam thảo (<i>Pulveres radices glycyrrhizae</i>)	: 25mg
Bột Trần bì (<i>Pulveres pericarpium citri reticulatae</i>)	: 25mg
Cao đặc Đảng sâm (<i>Extractum radices codonopsis pilosulae</i>)	: 40mg

(tương đương với 133mg dược liệu)
Tá dược (croscarmellose sodium, than hoạt tính, sáp ong trắng, mật ong).....vừa đủ 1 viên



Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 230 viên.

Chỉ định:

Kiên tỳ, ích khí. Chữa chứng đau bụng, đầy hơi, gầy đầy tức ở thượng vị, ợ hơi, nôn mửa, ỉa chảy, khó tiêu, kiết lỵ, viêm đại tràng cấp và mạn tính.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 15 - 20 viên, uống sau bữa ăn.
- Dợt điều trị: 4 - 6 tuần, có thể dùng 2 - 3 đợt.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian sử dụng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn sống, lạnh, ôi, thiu.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Lỗ Minh Hùng