

2/1/87

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/12/2015

**LONG HUYẾT
P/H**

- **Thành phần (cho 1 viên):**
Cao khô Huyết giác (*Extraction from *dicentrone comboidenari**) 280mg (tương đương với 1mg huyết giác).
Tỷ được bali: 0,05 (0,1 viên).
- **Công Dụng:** Thông huyết, hành huyết, tiêu huyết, tá trợ phong.
- **Chỉ Định:** cảm đau, ban疹 như đốm đỏ, phát bị đốm, bị ngứa như ỉn bầm, sưng bầm, phỏng, thấp tê, nổi bóng ghẻ, gộp vết thương mạn tính.
- **CÁCH DÙNG:** TÍNH KHUẾ: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Hộp 2 vỉ x 12 viên nang cứng

Cao khô Huyết giác 280mg



- **CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:**
Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên, uống sau bữa ăn.
- **Chú ý:** Chỉ định không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.
- **TIÊU CHUẨN TCS:**
- **Điều kiện bảo quản:** nhiệt độ dưới 30°C

Số lô SX:
Ngày SX:
HĐ:



**LONG HUYẾT
P/H**

Hộp 2 vỉ x 12 viên nang cứng

Cao khô Huyết giác 280mg



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024



Handwritten signature





H/P/ LONG HUYẾT

Hộp 1 lọ x 60 viên nang cứng

- **THÀNH PHẦN:**
Cao khô Huyết giác (*Extractum ligni dicaccenae cambodiannaee*) 280mg
(tương đương với 4g dược liệu)
Tá dược vđ 1 viên
- **CÔNG DỤNG:** Thông huyết, hành huyết, tiêu huyết ú, trừ phong.
- **CHỈ ĐỊNH:** Giảm đau, làm tan máu dưới da, khi bị dãn, bị ngứa máu tím bầm, kinh bế, phong thấp tê mỏi, bong gân, grip vết thương mau lành.
- **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Lọ 60 viên nang cứng

LONG HUYẾT P/H

Cao khô Huyết giác 280mg



- **CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**
Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 4-6 viên, uống sau bữa ăn.
- **CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
- **TIÊU CHUẨN:** TCCS.
- **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

LONG HUYẾT P/H

■ **THÀNH PHẦN:**

Cao khô Huyết giác (*Extractum ligni dicaccenae cambodiannaee*) 280mg
(tương đương với 4g dược liệu).
Tá dược vđ 1 viên

- **CÔNG DỤNG:** Thông huyết, hành huyết, tiêu huyết ú, trừ phong.
- **CHỈ ĐỊNH:** Giảm đau, làm tan máu dưới da, khi bị dãn, bị ngứa máu tím bầm, kinh bế, phong thấp tê mỏi, bong gân, grip vết thương mau lành.
- **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.
- **CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Gm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

LONG HUYẾT P/H

Cao khô Huyết giác 280mg



LONG HUYẾT P/H

■ **CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**
Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 4-6 viên, uống sau bữa ăn.

- **TIÊU CHUẨN:** TCCS.
 - **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C.
- ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

LONG HUYẾT P/H

Cao khô Huyết giác 280mg



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



LONG HUYẾT P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Cao khô Huyết giác (*Extractum ligni dracaenae cambodiana*) : 280mg (tương đương với 4g dược liệu)

Tá dược (talc)vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên, hộp 1 lọ x 60 viên.

Công dụng: Thông huyết, hành huyết, tiêu huyết ứ, trừ phong.

Chỉ định: Giảm đau, làm tan máu dưới da, khi bị đánh, bị ngã máu tím bầm, kinh bế, phong thấp tê mỏi, bong gân, giúp vết thương mau lành.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 4 - 6 viên, uống sau bữa ăn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang có xuất huyết.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy