


1M/88(051)

15/08/2011



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 08/12/2011

Bayer (South East Asia) Pte Ltd
 63 Chulia Street
 OCBC Centre East, 14th Floor
 Singapore 049514



Bayer (South East Asia) Pte Ltd
63 Chulia Street
OCBC Centre East, 14th Floor
Singapore 049514

P 305 is Iris gradient not printing

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ



Bepanthen® Plus Creme

■ Thành phần

Tuýp 30 g chứa 1,5 g dexpanthenol và 150 mg chlorhexidine hydrochlorid

Tá dược: sáp paraffin trắng, paraffin lỏng, mỡ từ len (E913), polyoxyl 40 stearate, rượu cetyl, rượu stearyl, DL- pantolactone, nước tinh khiết.

■ Đóng gói : Tuýp 30 g

■ Chỉ định

Bepanthen® Plus Creme để điều trị trong các trường hợp:

- Các loại vết thương ở bề mặt khi có nguy cơ nhiễm trùng: các xây xước da, vết cắt nhỏ, các vết trầy da, da nứt nẻ, vết bỏng nhẹ, vết thương và da lở loét.
- Da bị kích ứng nhiễm trùng
- Tổn thương da và vết mổ ngoài da, vết thương phẫu thuật nhẹ

■ Chống chỉ định

Đã biết dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc
Chlorhexidine không được bôi khi màng nhĩ bị thủng

■ Lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và màng nhầy.

■ Tương tác thuốc và các tương tác khác

Chlorhexidine không thích hợp với xà phòng và các hợp chất mang tính kiềm. Để phòng ngừa sự giao thoa có thể xảy ra (đối

kháng hoặc thử hoạt tính), không nên dùng đồng thời Bepanthen® Plus Creme cùng lúc với các thuốc sát trùng khác.

■ **Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú**

Cho đến hiện nay vẫn chưa có dữ kiện cho thấy việc hạn chế sử dụng thuốc này đối với phụ nữ có thai và cho con bú

■ **Liều dùng và cách sử dụng**

Bôi một hoặc nhiều lần trong ngày, nếu cần thiết, bôi vào vết thương đã được làm sạch hoặc vào vùng da bị viêm nhiễm. Có thể băng vết thương, nhưng thường thì không cần thiết.

■ **Tác dụng không mong muốn**

Rất hiếm xảy ra, phản ứng dị ứng da/ và hay cảm giác nóng da sau khi bôi thuốc này lên da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

■ **Tác dụng tới khả năng lái xe và sử dụng máy móc**

Không có tác dụng nào trên khả năng lái xe và điều khiển máy móc được ghi nhận.

■ **Bảo quản thuốc và hạn dùng**

Tuổi thọ của thuốc là 3 năm kể từ ngày sản xuất

Không nên dùng thuốc quá hạn dùng đã ghi rõ trên hộp thuốc.

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C

■ **Thuốc được làm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.**

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

Nhà sản xuất: GP Grenzach Produktions GmbH

Emill Barell- Str.7, 79639 Grenzach- Wyhlen, Germany

Điện thoại: + 49 (7624) 907-0

Fax: + 49 (7624) 3420

Sản xuất dưới sự nhượng quyền của BBC Bayer

Consumer Care, Switzerland

Bayer (South East Asia) Pte Ltd
63 Chulia Street

OCBC Centre East, 14th Floor
Singapore 049514

Bayer