

<p>KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH</p> <p>DEXPIN</p> <p>Terpin hydrat.....100mg Dextromethorphan HBr10mg C.T.C.P.D.P HÀ TÂY</p>	<p>KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH</p> <p>DEXPIN</p> <p>Terpin hydrat.....100mg Dextromethorphan HBr10mg SDK:</p>	<p>KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH</p> <p>DEXPIN</p> <p>Terpin hydrat.....100mg Dextromethorphan HBr10mg SDK:</p>	<p>KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH</p> <p>DEXPIN</p> <p>Terpin hydrat.....100mg Dextromethorphan HBr10mg SDK:</p>
---	---	---	---



DEXPIN


BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang



DEXPIN



Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - T.P Hà Nội



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

DEXPIN



THÀNH PHẦN:
Terpin hydrat.....100mg
Dextromethorphan HBr.....10mg
Tá dược vđ.....1 viên

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
bên trong hộp)


Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

DEXPIN

SDK:
Số Lô SX:
Ngày SX:
HD :

124.85.48

Box of 10 blisters of 10 capsules



DEXPIN



Manufactured by:
HATAY PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY
La Khe - Ha Dong - Ha Noi City

DEXPIN

Box of 10 blisters of 10 capsules



Hướng dẫn sử dụng thuốc:

DEXPIN



- **Dạng thuốc:** Viên nang.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 10 vỉ x 10 viên
- **Thành phần:** Mỗi viên nang chứa:

Terpin hydrat	100mg
Dextromethorphan HBr	10mg
Tá dược vđ	1 viên

Tá dược gồm: (Lactose, Tinh bột mì, Avicel, Eragel, Natri lauryl sulfat, Gelatin, Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Phẩm màu chlorophyl E 140, Phẩm màu tartazin) .

- **Chỉ định:** Chữa các chứng ho do các nguyên nhân khác nhau, ho do kích ứng, viêm nhiễm đường hô hấp, ho do phản xạ sau phẫu thuật.

- **Cách dùng và liều dùng Người lớn:** Ngày uống mỗi lần 1-2 viên x 2 lần/ngày.

Trẻ em trên 30 tháng tuổi: Uống mỗi lần 1/2 -1 viên x 2 lần/ngày hoặc uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

- **Chống chỉ định:** Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú, trẻ em dưới 2 tuổi. Suy hô hấp ở bất kỳ mức độ nào. Ho do hen suyễn, dùng chung với IMAO.

- **Thận trọng:**

**Terpin hydrat:* Chưa có tài liệu báo cáo.

* *Dextromethorphan HBr:*

Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí.

Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp.

Dùng dextromethorphan có liên quan đến giải phóng histamin nên thận trọng với trẻ em bị dị ứng.

Lạm dụng và phụ thuộc dextromethorphan, có thể xảy ra(tuy hiếm), đặc biệt do dùng liều cao kéo dài.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Không dùng

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

**Terpin hydrat:* Chưa có tài liệu báo cáo.

* *Dextromethorphan HBr:*

- **Thường gặp :** Toàn thân: Mệt mỏi, chóng mặt.

Tuần hoàn: Nhịp tim nhanh.

Tiêu hoá: Buồn nôn.

Da: Đỏ bừng.

- **ít gặp:** Da : Nổi mào đay.

- **Hiếm gặp :** Da: Ngoại ban.

Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc."

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:**


**Terpin hydrat:* Chưa có tài liệu báo cáo.

* *Dextromethorphan HBr:*

Tránh dùng đồng thời với các ức chế MAO. Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc của dextromethorphan.

Quinidin ức chế cytochrom P₄₅₀ 2D6 có thể làm giảm chuyển hoá của dextromethorphan ở gan, làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn của dextromethorphan.

Không uống rượu khi dùng thuốc



- Quá liều và cách xử trí:

*Terpin hydrat: Chưa có tài liệu báo cáo.

* Dextromethorphan HBr:

- Triệu chứng : Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái mê, ảo giác, mất điều hoà, suy hô hấp, co giật.

- Điều trị : Hỗ trợ, dùng naloxon 2mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều 10mg.

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* Lưu ý: Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, móp méo, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

"**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

L a Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai