


788/8159

TN-33176 b51

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT



**THÀNH PHẦN:** (Cho 1 lọ x 100ml)  
 Mỗi lọ chứa 100ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 50g dược liệu đã qua chế biến gồm:  
 Bạch Bộ ..... 50g  
 Tã được ..... vừa đủ 100ml

**CHỈ ĐỊNH:**  
 Ôn phế, nhuận phế, chỉ ho. Trị các chứng ho mới, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho gà, ho lao, viêm họng, viêm phế quản mạn tính.

**BẢO QUẢN:**  
 Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG**  
 Trụ sở: 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội  
 Nhà máy GMP WHO: CCN Thanh Oai, Hà Nội  
 Tel: 04.33826222 \* Fax: 04.33978024  
 Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Hộp 1 lọ x 100ml

**THUỐC HO**  
**BẠCH BỘ**  
**P/H**

Cao Lỏng



**ÔN PHẾ - NHUẬN PHẾ - CHỈ HO**



**PHUC HUNG**

**CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**  
 Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:  
 - Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.  
 - Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.  
 - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30 ml.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

**SĐK:**  
**Số lô SX:**  
**Ngày SX:**  
**HD:**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Hộp 1 lọ x 100ml

**THUỐC HO**  
**BẠCH BỘ**  
**P/H**

Cao Lỏng



**ÔN PHẾ - NHUẬN PHẾ - CHỈ HO**



**PHUC HUNG**

<b>CAO LỎNG</b>	<b>CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG</b>	Số lô SX: Ngày SX: HD:
<b>SĐK:</b>	<b>THUỐC HO</b>	<b>CÁCH DÙNG &amp; LIỀU DÙNG:</b> Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn: - Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml. - Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml. - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30 ml.
<b>THÀNH PHẦN:</b> (Cho 1 lọ x 100ml) Mỗi lọ chứa 100ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 50g dược liệu đã qua chế biến gồm: Bạch Bộ ..... 50g Tã được ..... vừa đủ 100ml	<b>BẠCH BỘ</b> <b>P/H</b>	<b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH:</b> Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. <b>TIÊU CHUẨN:</b> TCCS.
<b>CHỈ ĐỊNH:</b> Ôn phế, nhuận phế, chỉ ho. Trị các chứng ho mới, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho gà, ho lao, viêm họng, viêm phế quản mạn tính.	<b>ÔN PHẾ - NHUẬN PHẾ - CHỈ HO</b>	<b>ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM</b> <b>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG</b>
<b>BẢO QUẢN:</b> Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.	Hộp 1 lọ x 100ml	







**THÀNH PHẦN:** (Cho 1 lọ x 90ml)  
 Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 45g dược liệu đã qua chế biến gồm:  
 Bạch Bộ .....45g  
 Tã được .....vừa đủ 90ml

**CHỈ ĐỊNH:**  
 Ôn phế, nhuận phế, chỉ ho. Trị các chứng ho mới, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho gà, ho lao, viêm họng, viêm phế quản mạn tính.


**BẢO QUẢN:**  
 Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG**  
 Trụ sở: 96 - 98 Nguyễn Việt Xuân, Hà Đông, Hà Nội  
 Nhà máy GMP WHO: CCN Thanh Oai, Hà Nội  
 Tel: 04.33826222 \* Fax: 04.33978024  
 Website: www.dongduocphuchung.com.vn


Hộp 1 lọ x 90ml

**THUỐC HO**  
**BẠCH BỘ**  
**P/H**

Cao lỏng



**ÔN PHẾ - NHUẬN PHẾ - CHỈ HO**



**PHUC HUNG**

**CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**  
 Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:  
 - Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.  
 - Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.  
 - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30 ml.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.


**SDK:**  
**Số lô SX:**  
**Ngày SX:**  
**HD:**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**


Hộp 1 lọ x 90ml

**THUỐC HO**  
**BẠCH BỘ**  
**P/H**

Cao lỏng



**ÔN PHẾ - NHUẬN PHẾ - CHỈ HO**



**PHUC HUNG**

<p><b>CAO LỎNG</b></p> <p><b>SDK:</b></p> <p><b>THÀNH PHẦN:</b> (Cho 1 lọ x 90ml)          Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 45g dược liệu đã qua chế biến gồm:          Bạch Bộ .....45g          Tã được .....vừa đủ 90ml</p> <p><b>CHỈ ĐỊNH:</b>          Ôn phế, nhuận phế, chỉ ho. Trị các chứng ho mới, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho gà, ho lao, viêm họng, viêm phế quản mạn tính.</p> <p><b>BẢO QUẢN:</b>          Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.</p>	<p><b>CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG</b></p> <p><b>THUỐC HO</b>  <b>BẠCH BỘ</b>  <b>P/H</b></p> <p><b>ÔN PHẾ - NHUẬN PHẾ - CHỈ HO</b></p> <p>Hộp 1 lọ x 90ml</p>	<p><b>Số lô SX:</b>  <b>Ngày SX:</b>  <b>HD:</b></p> <p><b>CÁCH DÙNG &amp; LIỀU DÙNG:</b>          Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:          - Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.          - Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.          - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30 ml.</p> <p><b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH:</b>          Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.</p> <p><b>TIÊU CHUẨN:</b> TCCS.</p> <p><b>ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM</b>  <b>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG</b></p>
---	--	---





# TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh

## THUỐC HO BÁCH BỘ P/H

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thành phần: (cho 1 lọ)

Thành phần	Lọ 90ml: Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 45g dược liệu đã qua chế biến gồm:	Lọ 100ml: Mỗi lọ chứa 100ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 50g dược liệu đã qua chế biến gồm:
Bách bộ ( <i>Radix Stemonae tuberosae</i> )	45g	50g
Tá dược (natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết)	vừa đủ 90ml	vừa đủ 100ml

**Dạng bào chế:** Thuốc được bào chế dưới dạng cao lỏng màu nâu sẫm, vị ngọt hơi đắng, có mùi thơm của dược liệu.

**Quy cách đóng gói:** Thuốc được đóng trong lọ nhựa. Hộp 1 lọ x 90ml, hộp 1 lọ x 100ml.

**Thuốc dùng cho bệnh gì?**

Thuốc ho Bách bộ P/H được dùng để điều trị các chứng ho mới, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho gà, ho lao, viêm họng, viêm phế quản mạn tính.

**Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?**

Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:  
Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.  
Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.  
Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml.

**Khi nào không nên dùng thuốc này?**

Không dùng thuốc trong trường hợp tỳ vị hư hàn.

**Tác dụng không mong muốn:**

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

**Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?**

Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua ...

**Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?**

Không nên uống bù khi một lần quên không dùng thuốc vì có thể dẫn tới trường hợp quá liều.

**Cần bảo quản thuốc này như thế nào?**

Bảo quản nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:**

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về các dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều.

**Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?**

Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:**

Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

**Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ?**

- Nếu thấy có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.
- Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.**

**Hạn dùng của thuốc:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.





**Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:**

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng.

Trụ sở: Số 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Website: [www.dongduocphuchung.com.vn](http://www.dongduocphuchung.com.vn)

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222; Fax: 04. 33978024

**Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:**

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

**Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế**

**Chỉ định:** Ôn phế, nhuận phế, chỉ ho. Trị các chứng ho mới, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho gà, ho lao, viêm họng, viêm phế quản mạn tính.

**Liều dùng & cách dùng:**

Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:

Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.

Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.

Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml.

**Chống chỉ định:** Không dùng thuốc trong trường hợp tỳ vị hư hàn.

**Thận trọng:** Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

**Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:** Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua ....

**Tác dụng không mong muốn:** Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

**Quá liều và cách xử trí:** Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.



TUQ.CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
*Lô Minh Hùng*

