



# Chính hãng

## Salbutamol 2,5mg/2,5ml ; 5mg/2,5ml

**LIỀU DÙNG:** Mỗi ống 2,5ml chứa:  
Hoạt chất:  
+ Zensalbu Nebules 2.5: Salbutamol (dạng salbutamol sulphat).....2,5mg  
+ Zensalbu Nebules 5.0: Salbutamol (dạng salbutamol sulphat).....5,0mg  
**Tá dược:** Natri clorid, acid sulfuric, nước cất pha tiêm vừa đủ 2,5ml  
**Dạng bào chế:** Dung dịch dùng cho khí dung

**CHỈ ĐỊNH:**  
Thuốc được chỉ định trong các trường hợp sau:  
- Kiểm soát thường xuyên cơn thắt ngực mạn – không đáp ứng với điều trị quy ước.  
- Điều trị hen nặng cấp tính (cơn kích thích hen nặng và kéo dài không đáp ứng với điều trị chuẩn).

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**  
**Liều dùng:**  
Người lớn và trẻ em: Liều khởi đầu thích hợp của salbutamol dung dịch khí dung là 2,5mg.  
- Có thể tăng liều lên 5mg. Có thể dùng đến 4 lần/ngày. Khi điều trị tắc nghẽn đường dẫn khí nặng ở người lớn, liều dùng có thể cao hơn, lên đến 40mg/ngày, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ tại bệnh viện.  
- Hiệu quả lâm sàng của Zensalbu nebules ở trẻ em dưới 18 tháng tuổi là không được biết rõ ràng. Nên cân nhắc dùng liệu pháp bổ sung oxy do có thể xuất hiện thiếu oxy huyết thoáng qua.  
- Khi dùng liều quá cao có thể gây ra tác dụng ngoại ý do đó chỉ nên tăng liều hoặc tăng tần suất sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.  
- Nếu liều dùng hiệu quả trước đây tỏ ra kém đáp ứng trong vòng ít nhất 3 giờ, cần đến bác sĩ ngay.

**Cách dùng:**  
Không được tiêm hoặc uống dung dịch khí dung.  
- Zensalbu nebules được sử dụng với máy khí dung theo hướng dẫn của bác sĩ.  
- Đối với hầu hết bệnh nhân, thời gian tác dụng của Zensalbu nebules từ 4-6 giờ. Zensalbu nebules được thiết kế để sử dụng dưới dạng không pha loãng. Tuy nhiên, nếu muốn kéo dài thời gian

phân phối thuốc (hơn 10 phút) thì có thể cần pha loãng bằng nước muối vô trùng thông thường.  
- Sử dụng ngày càng nhiều các thuốc chủ vận beta - 2-adrenergic có thể làm biểu hiện của bệnh hen nặng lên. Trong những trường hợp này có thể tiến hành việc đánh giá lại phác đồ điều trị của bệnh nhân và nên xem xét việc điều trị kết hợp đồng thời với glucocorticosteroid.

Dung dịch thuốc Zensalbu nebules dùng để hít qua máy khí dung.  
Cách chuẩn bị thuốc cho máy phun khí dung:  
1. Bẻ một ống Zensalbu nebules ra bằng cách xoay một ống xuống phía dưới và tách ra trong khi vẫn giữ chắc phần còn lại của vỉ Nebules.  
2. Giữ chắc một đầu của ống Zensalbu nebules, xoay phần thân ống để mở nắp.  
3. Đưa đầu hở của ống Zensalbu nebules vào trong chén đựng dung dịch của máy phun khí dung. Bóp từ từ ống Zensalbu nebules để rót dung dịch thuốc vào trong chén. Chú ý rót hết dung dịch thuốc Zensalbu nebules vào trong chén.  
4. Chuẩn bị máy khí dung và sử dụng theo chỉ dẫn.  
5. Sau khi sử dụng xong, cần bỏ hết dung dịch còn thừa trong chén đựng của máy khí dung, sau đó lau sạch máy phun khí dung theo như hướng dẫn trong máy.  
- Có thể sử dụng mặt nạ, thiết bị chữ "T" hoặc qua ống nội khí quản để phân phối thuốc. Có thể sử dụng thông khí áp lực dương ngắt quãng nhưng hiếm khi là cần thiết.  
- Cần cho thở oxy khi có nguy cơ thiếu oxy huyết do giảm thông khí.  
- Do nhiều loại máy khí dung hoạt động trên nguyên tắc dòng khí liên tục, có thể thuốc khí dung sẽ được giải phóng vào môi trường xung quanh. Do đó, nên sử dụng Zensalbu nebules trong phòng có thông khí tốt, nhất là ở bệnh viện khi có nhiều bệnh nhân sử dụng máy khí dung cùng một lúc.  
Chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.  
**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  
**NHÀ SẢN XUẤT:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI