

235/Đ148

## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc : **DilodinDHG**

Dạng thuốc : **VIÊN NÉN BAO PHIM**

Hàm lượng cho 1 viên:

<b>Diosmin</b>	<b>450 mg</b>
<b>Hesperidin</b>	<b>50 mg</b>

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

**CÔNG TY TNHH MTV  
DƯỢC PHẨM DHG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc:

**DilodinDHG**

Dạng thuốc:

**VIÊN NÉN BAO PHIM**

Hàm lượng cho 1 viên:


<b>Diosmin</b>	<b>450 mg</b>
<b>Hesperidin</b>	<b>50 mg</b>



Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG  
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.  
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG  
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

\* Nhãn trên vỉ 10 viên:

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 08/12/2014



<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg	<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg	<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg	<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg
<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg	<b>DHG PHARMA</b> Sản xuất tại: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg
Số lô SX:            HD:			
<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg	<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg	<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg	<b>DilodinDHG</b> Diosmin ..... 450 mg Hesperidin ... 50 mg

\* Nhãn trên hộp 5 vỉ x 10 viên:



Để xa tầm tay trẻ em.  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
 Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.  
 READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE.  
 STORAGE CONDITIONS: STORE IN DRY PLACES,  
 NOT EXCEEDING 30°C, PROTECT FROM LIGHT.

Số đăng ký (Reg. No.):  
 0710.3959000

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG**  
 Khu công nghiệp Tân Phú Thành, Cầu Thành A, Hậu Giang  
 ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555



GMP-WHO

Box of 5 blisters x 10 film coated tablets

**Dilodin DHG**

Diosmin ..... 450 mg  
 Hesperidin ... 50 mg

DHG PHARMA


PROTECTS VESSEL WALLS

Box of 5 blisters x 10 film coated tablets


**Dilodin DHG**

Diosmin ..... 450 mg  
 Hesperidin ... 50 mg

<b>THÀNH PHẦN:</b>	
Diosmin .....	450 mg
Hesperidin .....	50 mg
Tà dược vừa đủ .....	1 viên
<b>CHỈ ĐỊNH -</b>	
<b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH -</b>	
<b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:</b>	
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.	
<b>COMPOSITION:</b>	
Diosmin .....	450 mg
Hesperidin .....	50 mg
Excipients q.s. ....	1 tablet
<b>INDICATIONS -</b>	
<b>CONTRAINDICATIONS -</b>	
<b>DOSAGE &amp; ADMINISTRATION:</b>	
Please see the enclosed leaflet.	



\* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên:




**THÀNH PHẦN:**  
 Diosmin ..... 450 mg  
 Hesperidin ..... 50 mg  
 Tá dược vừa đủ ..... 1 viên

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các triệu chứng liên quan đến cơn trĩ cấp và bệnh trĩ mạn.  
 Điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tuần hoàn tĩnh mạch bạch huyết: đau chân, nặng chân, phù chân, giãn tĩnh mạch, sau viêm tĩnh mạch, vpp bẻ.  
**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.


**COMPOSITION:**  
 Diosmin ..... 450 mg  
 Hesperidin ..... 50 mg  
 Excipients q.s ..... 1 tablet

**INDICATIONS:**  
 Treatment of the symptoms of acute haemorrhoidal attacks and chronic haemorrhoidal disease.  
 Treatment of the symptoms associated with functional venous insufficiency of the lower limbs e.g heavy legs, pain, oedema, varicose veins; phlebitis; cramps.

**CONTRAINDICATIONS:**  
**DOSAGE & ADMINISTRATION:**  
 Please see the enclosed leaflet.



Để xa tầm tay trẻ em.  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
 Bảo quản nơi khô,  
 nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.



## MẪU NHÃN SỬA THEO GÓP Ý

\* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:**



# Dilodin DHG

Diosmin 450 mg  
Hesperidin 50 mg

**CÔNG THỨC:**

Diosmin ..... 450 mg

Hesperidin ..... 50 mg

Tá dược vừa đủ ..... 1 viên

(Tinh bột ml, avicel, PVP, magnesi stearat, HPMC, PVA, PEG 6000, talc, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt vàng).

**DANG BẢO CHẾ:** Viên nén bao phim.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 5 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên.

**TÍNH CHẤT:** Thành phần chính của DilodinDHG là phân đoạn flavonoid tinh khiết (diosmin, hesperidin), dạng vi hạt, có tác dụng làm bền thành mạch. Thuốc tác dụng bằng cách ức chế men hyaluronidase, một loại enzym làm tăng tính thấm của mao mạch. Khi enzym này thừa thì gây hiện tượng xuất huyết dưới da.

DilodinDHG có tác dụng làm giảm tính căng giãn của tĩnh mạch, giảm ứ trệ ở tĩnh mạch, làm bình thường hóa tính thấm của mao mạch và tăng cường sức bền của mao mạch. DilodinDHG được dùng trong các trường hợp rối loạn chức năng tĩnh mạch, đặc biệt trong điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp nội khoa.

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các triệu chứng liên quan đến cơn trĩ cấp và bệnh trĩ mạn.

Điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tuần hoàn tĩnh mạch bạch huyết: đau chân, nặng chân, phù chân, giãn tĩnh mạch, sau viêm tĩnh mạch, vọp bẻ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú.

**THẬN TRỌNG:** Chưa tìm thấy tài liệu.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Các nghiên cứu ở động vật cho thấy thuốc không có khả năng gây quái thai và cho đến nay không có một tác dụng xấu nào được ghi nhận. Chưa có số liệu về khả năng thuốc có qua được sữa mẹ hay không. Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa tìm thấy tài liệu.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Rối loạn tiêu hóa, hiếm gặp rối loạn thần kinh thực vật nhẹ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Chưa tìm thấy tài liệu.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Chia làm 2 lần uống, trong các bữa ăn trưa và tối.

**Cơn trĩ cấp:** 6 viên/ ngày, trong 4 ngày đầu; 4 viên/ ngày, trong 3 ngày tiếp theo; sau đó uống liều duy trì 2 viên/ ngày.

**Bệnh trĩ mạn:** 2 viên/ ngày.

**Suy tĩnh mạch (đau chân, nặng chân, phù chân, giãn tĩnh mạch, sau viêm tĩnh mạch, vọp bẻ (chuột rút)):** 2 viên/ ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG**

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

Tư Vấn Khách Hàng

0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

www.dhgpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng